

A549-RFP šūnas | 305659

Vispārīga informācija

Description

A549-RFP ir fluorescējoši marķēts cilvēka A549 plaušu adenokarcinomas šūnu līnijas atvasinājums, kas izstrādāts, lai konstitutīvi ekspresētu sarkano fluorescējošo proteīnu (RFP) reāllaika vizualizācijai un izsekošanai. Vecāku A549 līnija tika izveidota no pieauguša donora plaušu adenokarcinomas un uzrāda epitēlija morfoloģiju ar adhēzīvu augšanas raksturlielumiem. A549 šūnas saglabā II tipa alveolāro epitēlija šūnu īpašības, tostarp citokeratīnu ekspresiju un spēju ražot ar virsmas aktīvo vielu saistītas proteīnas. Stabils RFP ekspresijas kasetes ieviešana nodrošina nepārtrauktu fluorescenci, būtiski nemainot vecāku līnijas iekšējās proliferatīvās un metaboliskās īpašības, padarot A549-RFP piemērotu gareniskajiem attēlveidošanas pētījumiem.

A549 šūnu funkcionālā raksturošana lielās vēža šūnu panelīs ir parādījusi, ka šūnu izmērs, proteīnu saturs un proteīnu sintēzes ātrums ir pozitīvi korelēti ar šūnu tilpumu un ka lielākas šūnas mēdz proliferēt lēnāk. Salīdzinošās analizēs A549 šūnas ir pozicionētas starp relatīvi mazākām, ātrāk proliferējošām epitēlija vēža šūnu līnijām, pretstatā lielākām, mesenchimāliem līdzīgām šūnām, kurām ir augstāka vimentīna ekspresija un zemāks E-kadherīna līmenis. Šīs metaboliskās un fenotipiskās atšķirības ir nozīmīgas eksperimentālajā interpretācijā, jo proteīnu sintēzes ātrums un metaboliskie plūsmi ir atkarīgi no šūnu izmēra un ietekmē jutību pret vielām, kas vērstas pret vairošanos vai mTOR regulētiem anaboliskajiem ceļiem. RFP modifikācija saglabā A549 šūnu piemērotību šādiem metaboliskiem un farmakoloģiskiem pētījumiem, vienlaikus nodrošinot tiešu vizualizāciju.

A549-RFP plaši izmanto kopkultūras sistēmās, ortotopiskos un ektopiskos ksenotransplantātu modeļos, kā arī invāzijas vai metastāžu testos, kur fluorescences marķējums atvieglo audzēja šūnu atšķiršanu no stromas vai saimnieka komponentiem. Stabils sarkanā fluorescences nodrošina tādas lietojumprogrammas kā dzīvo šūnu attēlveidošana, augstas izšķirtspējas skrīnings, plūsmas citometrijas balstīta kvantificēšana un in vivo optiskā attēlveidošana. Kā labi raksturota plaušu adenokarcinomas modeļa izsekojams variants, A549-RFP nodrošina stabilu platformu audzēja šūnu proliferācijas, epitēlija-mezodermālo pāreju, zāļu reakcijas un audzēja mikroapstākļu mijiedarbības pētīšanai gan in vitro, gan in vivo apstākļos.

Organism Cilvēks

Tissue Plaušas

Disease Plaušu adenokarcinoma

Synonyms A 549, A549, NCI-A549, A549/ATCC, A549 ATCC, A549ATCC, hA549

Raksturojums

Age 58 gadi

Gender Vīrieši

Ethnicity Kaukāzietis

A549-RFP šūnas | 305659

Growth properties Adherent

Normatīvie dati

Citation A549-RFP (Cytion kataloga numurs 305659)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_0023

GMO Status GMO-S1: Šī A549 plaušu karcinomas līnija satur lentivīrusu RFP konstrukciju, kas ļauj veikt sarkanu fluorescences attēlveidošanu. Šī klasifikācija attiecas tikai uz Vāciju un citās valstīs var atšķirties.

Biomolekulārie dati

Protein expression RFP

Antigen expression RFP (sarkana fluorescējoša olbaltumviela)

MSI-status Mutācija: p.Gly12Ser, homozigota; Mutācija: p.Gln37Ter, homozigota

Mutational profile Mutācija: p.Gly12Ser, homozigota; Mutācija: p.Gln37Ter, homozigota

Darbs ar

Culture Medium DMEM: Ham's F12 (1:1), satur: 3,1 g/l glikozes, satur: 2,5 mM L-glutamīna, satur: 15 mM HEPES, satur: 0,5 mM nātrija piruvāta, satur: 1,2 g/l NaHCO₃ (Cytion preces numurs 820400a)

Supplements Papildināt barotni ar 10% FBS

Dissociation Reagent Accutase

Doubling time 20–40 stundas

A549-RFP šūnas | 305659

Freeze medium

Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni + 10% DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas.

Thawing and Culturing Cells

1. Pārliecinieties, ka pēc piegādes flakons paliek dziļi sasaldēts, jo šūnas tiek sūtītas uz sausā ledus, lai pārvadāšanas laikā saglabātu optimālu temperatūru.
2. Pēc saņemšanas vai nu nekavējoties uzglabāt kriovialu temperatūrā, kas zemāka par -150 °C, lai nodrošinātu šūnu integritātes saglabāšanu, vai arī turpināt 3. posmu, ja nepieciešama tūlītēja kultivēšana.
3. Tūlītējas kultivēšanas gadījumā ātri atkausējiet flakonu, iegremdējot to 37°C ūdens vannā ar tīru ūdeni un antibakteriālu līdzekli, viegli maisot 40-60 sekundes, līdz paliek neliels ledus gabaliņš.
4. Visas turpmākās darbības veiciet sterilos apstākļos plūsmas nosūcējā, pirms atvēršanas dezinficējot kriovialu ar 70% etanolu.
5. Uzmanīgi atveriet dezinficēto flakonu un pārnesiet šūnu suspensiju 15 ml centrifūgas mēģenē, kurā ir 8 ml istabas temperatūras barotnes, uzmanīgi samaisot.
6. Maisījumu centrifugē pie 200 x g 5 minūtes, virsgatavumu, kas satur sasaldēšanas barotni, uzmanīgi izmet.
7. Veikt procedūru, kas aprakstīta sadaļā "Atjaunošana pēc atkausēšanas"

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO_2 , mitrināta atmosfēra.

Flask Coating

Neviens

Shipping Conditions

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidrums daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

Storage Conditions

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpekļī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Kvalitātes kontrole / Ģenētiskais profils / HLA