

## KHOS-NP Cellen | 300235

## Algemene informatie

## Description

KHOS-NP is een cellijn die is afgeleid van de HOS-cellijn door transformatie met het Kirsten-muizensarcoomvirus (Ki-MSV). Het transformatieproces heeft geresulteerd in een zeer tumorogene cellijn die wordt gekenmerkt door verschillende onderscheidende eigenschappen, waardoor deze waardevol is voor specifieke onderzoekstoepassingen. De KHOS-NP-cellen zijn met name nuttig voor de productie van MSV-pseudotypes met verschillende ecotrope en xenotrope muizenleukemievirussen, wat interessant is voor studies gericht op virale replicatie, oncogenese en gerelateerde pathways.

KHOS-NP-cellen vertonen hechtende groeieigenschappen en zijn afkomstig van het botweefsel van een blanke, volwassen vrouw. De cellen dragen het Ki-MSV-genoom, maar produceren geen infectieuze virusdeeltjes of virale antigenen, waardoor ze veilig zijn voor bepaalde in-vitroonderzoeksomgevingen waar de productie van infectieuze virussen een probleem zou kunnen vormen. Desondanks behouden de KHOS-NP-cellen een hoge verzadigingsdichtheid en hebben ze een hoge plating-efficiëntie in zachte agar, wat wijst op robuuste proliferatieve en verankering-onafhankelijke groeikenmerken, die typisch zijn voor getransformeerde en tumorige cellijnen.

In vivo zijn KHOS-NP-cellen zeer tumorigeen, met een frequentie van 100% tumorvorming bij naakte muizen binnen 21 dagen na inoculatie bij subcutane injectie met  $10^7$  cellen. Deze eigenschappen maken de KHOS-NP-cellijn tot een waardevol model voor het bestuderen van sarcoomontwikkeling, tumorbiologie en de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan oncogenese. Het is echter essentieel om op te merken dat KHOS-NP-cellen niet geschikt zijn voor therapeutische of in vivo-toepassingen en dat het gebruik ervan beperkt moet blijven tot gecontroleerde experimentele omstandigheden in een onderzoeksomgeving.

## Organism

Mens

## Tissue

Bot

## Disease

Osteosarcoom

## Synonyms

KHOS/NP, KHOS NP, KHOSNP, R-970-5, KHOS

## Kenmerken

## Age

13 jaar

## Gender

Vrouw

## Ethnicity

Kaukasisch

## Morphology

Fibroblast-achtige

## Growth properties

Monolaag, adherent

## KHOS-NP Cellen | 300235

## Regelgevende gegevens

<b>Citation</b>	KHOS-NP (Cytion catalogusnummer 300235)
<b>Biosafety level</b>	1
<b>NCBI_TaxID</b>	9606
<b>CellosaurusAccession</b>	CVCL_2546

## Biomoleculaire gegevens

<b>Tumorigenic</b>	Ja, in naakte muizen.
--------------------	-----------------------

## Omgaan met

<b>Culture Medium</b>	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2,2 g/L NaHCO <sub>3</sub> , w: EBSS (Cytion artikelnummer 820100a)
<b>Supplements</b>	Vul het medium aan met 10% FBS en 1% NEAA
<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
<b>Subculturing</b>	Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenden en vervolgens centrifugerend bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.
<b>Split ratio</b>	Een verhouding van 1:2 tot 1:4 wordt aanbevolen
<b>Seeding density</b>	$2 \times 10^4$ cellen/cm <sup>2</sup>
<b>Fluid renewal</b>	2 tot 3 keer per week
<b>Post-Thaw Recovery</b>	Na ontdooien, de cellen op een plaat aanbrengen met een dichtheid van $5 \times 10^4$ cellen/cm <sup>2</sup> en de cellen minstens 24 uur laten herstellen van het invriesproces en zich hechten.

## KHOS-NP Cellen | 300235

### Freeze medium

Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimeidium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

### Thawing and Culturing Cells

1. Controleer of de flacon bij levering diepgevroren blijft, aangezien de cellen op droog ijs worden verzonden om optimale temperaturen tijdens het transport te behouden.
2. Bewaar het cryoflesje na ontvangst onmiddellijk bij temperaturen lager dan  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$  om de integriteit van de cellen te behouden, of ga verder met stap 3 als onmiddellijke kweek vereist is.
3. Voor onmiddellijke kweek: ontdooi de flacon snel door deze onder te dompelen in een waterbad van  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$  met schoon water en een antimicrobieel middel, waarbij u 40-60 seconden zachtjes schudt totdat er een klein ijsklontje overblijft.
4. Voer alle volgende stappen uit onder steriele omstandigheden in een stromingskap en desinfecteer de cryoflacon met 70% ethanol voordat deze wordt geopend.
5. Open voorzichtig de gedesinfecteerde flacon en breng de celsuspensie over in een centrifugebuis van 15 ml met 8 ml kweekmedium op kamertemperatuur en meng voorzichtig.
6. Centrifugeer het mengsel gedurende 3 minuten bij  $300 \times g$  om de cellen te scheiden en gooi het supernatant met resterend vriesmedium voorzichtig weg.
7. Resuspendeer de celpellet voorzichtig in 10 ml vers kweekmedium. Verdeel voor adherente cellen de suspensie over twee T25-kweekkolven; breng voor suspensiekweken al het medium over in één T25-kweekkolf om effectieve celinteractie en -groei te bevorderen.
8. Houd u aan de vastgestelde subcultuurprotocollen voor continue groei en onderhoud van de cellijn, om betrouwbare experimentele resultaten te garanderen.

### Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , bevochtigde atmosfeer.

### Flask Coating

Geen

### Freezing Procedure

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

## KHOS-NP Cellen | 300235

### Shipping Conditions

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

### Storage Conditions

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

## Kwaliteitscontrole / Genetisch profiel / HLA

### Sterility

Mycoplasma-verontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasma-detectiemethoden.

Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

### STR profiel

**Amelogenin:** x,x  
**CSF1PO:** 12  
**D13S317:** 12  
**D16S539:** 10,13  
**D5S818:** 13  
**D7S820:** 11,12  
**TH01:** 6  
**TPOX:** 8,11  
**vWA:** 18  
**D3S1358:** 15  
**D21S11:** 31.2,32.2  
**D18S51:** 17  
**Penta E:** 7,12  
**Penta D:** 9,10  
**D8S1179:** 11,14  
**FGA:** 24  
**PEZ6:** HROG13