

HCC78-cellen | 302156

Algemene informatie

Description

HCC78 is een cellijn afkomstig van een primaire tumor van een longadenocarcinoom, specifiek een subtype dat bekend staat als mucineus bronchioloalveolair carcinoom. Deze cellijn is afkomstig van een mannelijke volwassen patiënt. HCC78-cellen zijn vooral bekend vanwege hun unieke chromosoomherschikking waarbij de ROS1- en SLC34A2-genen betrokken zijn, wat resulteert in het fusie-eiwit SLC34A2-ROS1. Dit fusie-eiwit is betrokken bij oncogene signaalwegen, waardoor HCC78 een waardevol model is voor het bestuderen van de moleculaire mechanismen van ROS1-fusie-positieve longkankers en voor het testen van gerichte therapieën tegen ROS1.

In onderzoekscontexten is HCC78 uitgebreid gebruikt om de werkzaamheid en het werkingsmechanisme van ROS1-remmers te onderzoeken. Deze studies hebben het nut van de cellijn aangetoond in preklinische beoordelingen van de gevoeligheid voor geneesmiddelen, resistentiemechanismen en de cellulaire routes die beïnvloed worden door ROS1-activiteit. De cellijn groeit adherent en vertoont een epitheliale morfologie, die karakteristiek is voor bronchioloalveolaire tumoren. De genetische en fenotypische kenmerken van HCC78 maken het een essentieel instrument voor longkankeronderzoek, vooral voor onderzoeken gericht op doelgerichte therapieën en gepersonaliseerde geneeskunde in de behandeling van ROS1-positieve kankers.

Organism

Mens

Tissue

Pleurale effusie

Disease

Adenocarcinoom

Synonyms

HCC-78, HCC0078, Hamon Kankercentrum 78

Kenmerken

Age

65 jaar

Gender

Mannelijk

Ethnicity

Europese

Growth properties

Monolaag, adherent

Regelgevende gegevens

Citation

HCC78 (Cytion catalogusnummer 302156)

Biosafety level

1

HCC78-cellen | 302156

NCBI_TaxID 9606**CellosaurusAccession** CVCL_2061**Biomoleculaire gegevens****Omgaan met****Culture Medium** RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L NaHCO₃ (Cytion artikelnummer 820700a)**Supplements** Vul het medium aan met 10% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenden en vervolgens centrifugeren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.**Freeze medium** Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedum (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

HCC78-cellen | 302156

Thawing and Culturing Cells

1. Controleer of de flacon bij levering diepgevroren blijft, aangezien de cellen op droog ijs worden verzonden om optimale temperaturen tijdens het transport te behouden.
2. Bewaar het cryoflesje na ontvangst onmiddellijk bij temperaturen lager dan $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$ om de integriteit van de cellen te behouden, of ga verder met stap 3 als onmiddellijke kweek vereist is.
3. Voor onmiddellijke kweek: ontdooi de flacon snel door deze onder te dompelen in een waterbad van $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ met schoon water en een antimicrobieel middel, waarbij u 40-60 seconden zachtjes schudt totdat er een klein ijsklontje overblijft.
4. Voer alle volgende stappen uit onder steriele omstandigheden in een stromingskap en desinfecteer de cryoflacon met 70% ethanol voordat deze wordt geopend.
5. Open voorzichtig de gedesinfecteerde flacon en breng de celsuspensie over in een centrifugebuis van 15 ml met 8 ml kweekmedium op kamertemperatuur en meng voorzichtig.
6. Centrifugeer het mengsel gedurende 3 minuten bij $300 \times g$ om de cellen te scheiden en gooi het supernatant met resterend vriesmedium voorzichtig weg.
7. Resuspendeer de celpellet voorzichtig in 10 ml vers kweekmedium. Verdeel voor adherente cellen de suspensie over twee T25-kweekkolven; breng voor suspensiekweken al het medium over in één T25-kweekkolf om effectieve celinteractie en -groei te bevorderen.
8. Houd u aan de vastgestelde subcultuurprotocollen voor continue groei en onderhoud van de cellijn, om betrouwbare experimentele resultaten te garanderen.

Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$, 5% CO_2 , bevochtigde atmosfeer.

Flask Coating

Geen

Freezing Procedure

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

Shipping Conditions

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

HCC78-cellen | 302156

Storage Conditions

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Kwaliteitscontrole / Genetisch profiel / HLA

Sterility

Mycoplasma-verontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasma-detectiemethoden.

Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.