

## HK-CRISPR-Pom121-mCherry cellen | 300658

## Algemene informatie

## Description

De HK-CRISPR-Pom121-mCherry cellijn is een genetisch gemanipuleerde variant van HeLa Kyoto cellen, ontworpen voor geavanceerd cellulair onderzoek. Deze cellen zijn gemodificeerd met CRISPR-Cas9-technologie om een fluorescerende mCherry-tag toe te voegen aan het Pom121-gen, een belangrijk onderdeel van het nucleaire poriëncomplex (NPC). Deze modificatie stelt onderzoekers in staat om Pom121 in real-time te visualiseren, wat helpt bij studies naar nucleaire dynamica en NPC-functies.

De mCherry tag, die rode fluorescentie uitstraalt, vergemakkelijkt gedetailleerd onderzoek van NPC-gedrag en nucleair-cytoplasmatisch transport met behulp van fluorescentiemicroscopie. Deze cellijn is een waardevol hulpmiddel voor het onderzoeken van nucleaire poreiwitten, genexpressieregulatie, celcycluscontrole en signaaltransductie.

**Organism** Mens

**Tissue** Endocervix

**Disease** Adenocarcinoom

## Kenmerken

**Age** 30 jaar

**Gender** Vrouw

**Ethnicity** Afro-Amerikaan

**Morphology** Epitheelachtige cellen met mozaïeksteenvorm

**Growth properties** Aanhangend

## Regelgevende gegevens

**Citation** HK-CRISPR-Pom121-mCherry (Cytion catalogusnummer 300658)

**Biosafety level** 1

**NCBI\_TaxID** 9606

**Depositor** Het Ellenberg Lab (EMBL)

## HK-CRISPR-Pom121-mCherry cellen | 300658

**GMO Status** GMO-S1: Deze HeLa Kyoto-lijn bevat een CRISPR-gemedieerde mCherry-tag op Pom121 die visualisatie van membraancomponenten van de nucleaire porie mogelijk maakt. Deze classificatie is alleen van toepassing binnen Duitsland en kan elders afwijken.

### Biomoleculaire gegevens

**Protein expression** Pom121, mCherry-tag

### Omgaan met

**Culture Medium** DMEM, w: 4,5 g/L Glucose, w: 4 mM L-Glutamine, w: 3,7 g/L NaHCO<sub>3</sub>, w: 1,0 mM Natriumpyruvaat (Cytion artikelnummer 820300a)

**Supplements** Vul het medium aan met 10% FBS

**Dissociation Reagent** Accutase

**Subculturing** Verwijder het oude medium van de adherente cellen en was ze met PBS zonder calcium en magnesium. Gebruik voor T25-flesjes 3-5 ml PBS en voor T75-flesjes 5-10 ml. Bedek de cellen vervolgens volledig met Accutase, met 1-2 ml voor T25-flesjes en 2,5 ml voor T75-flesjes. Laat de cellen gedurende 8-10 minuten bij kamertemperatuur incuberen om ze los te maken. Na incubatie de cellen voorzichtig mengen met 10 ml medium om ze te resuspenderen en vervolgens centrifugereren bij 300xg gedurende 3 minuten. Gooi het supernatant weg, resuspendeer de cellen in vers medium en breng ze over in nieuwe kolven die al vers medium bevatten.

**Freeze medium** Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedum (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

## HK-CRISPR-Pom121-mCherry cellen | 300658

### Thawing and Culturing Cells

1. Controleer of de flacon bij levering diepgevroren blijft, aangezien de cellen op droog ijs worden verzonden om optimale temperaturen tijdens het transport te behouden.
2. Bewaar het cryoflesje na ontvangst onmiddellijk bij temperaturen lager dan  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$  om de integriteit van de cellen te behouden, of ga verder met stap 3 als onmiddellijke kweek vereist is.
3. Voor onmiddellijke kweek: ontdooi de flacon snel door deze onder te dompelen in een waterbad van  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$  met schoon water en een antimicrobieel middel, waarbij u 40-60 seconden zachtjes schudt totdat er een klein ijsklontje overblijft.
4. Voer alle volgende stappen uit onder steriele omstandigheden in een stromingskap en desinfecteer de cryoflacon met 70% ethanol voordat deze wordt geopend.
5. Open voorzichtig de gedesinfecteerde flacon en breng de celsuspensie over in een centrifugebuis van 15 ml met 8 ml kweekmedium op kamertemperatuur en meng voorzichtig.
6. Centrifugeer het mengsel gedurende 3 minuten bij  $300 \times g$  om de cellen te scheiden en gooi het supernatant met resterend vriesmedium voorzichtig weg.
7. Resuspendeer de celpellet voorzichtig in 10 ml vers kweekmedium. Verdeel voor adherente cellen de suspensie over twee T25-kweekkolven; breng voor suspensiekweken al het medium over in één T25-kweekkolf om effectieve celinteractie en -groei te bevorderen.
8. Houd u aan de vastgestelde subcultuurprotocollen voor continue groei en onderhoud van de cellijn, om betrouwbare experimentele resultaten te garanderen.

### Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , bevochtigde atmosfeer.

### Flask Coating

Geen

### Freezing Procedure

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

### Shipping Conditions

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

## HK-CRISPR-Pom121-mCherry cellen | 300658

### Storage Conditions

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

## Kwaliteitscontrole / Genetisch profiel / HLA

### Sterility

Mycoplasma-verontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasma-detectiemethoden.

Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.