

Celule RWPE-1 | 305217

Informații generale

Description

Linia celulară RWPE-1, derivată din epiteliul prostatic al unui bărbat caucazian în vârstă de 54 de ani, fără semne de cancer de prostată, este o resursă valoroasă în cercetarea biomedicală, în special pentru studiile privind biologia și cancerul de prostată. Aceste celule epiteliale, caracterizate prin proprietăți de creștere prin aderență și morfologie epitelială tipică, au fost immortalizate cu ajutorul unui retrovirus cu replicare deficitară care poartă gena E7 din papilomavirusul uman 18 (HPV-18), care inactivează proteina retinoblastomului și promovează imortalizarea celulară.

Celulele RWPE-1, provenite dintr-o prostată umană normală, sunt utilizate în cercetarea cancerului de prostată, deși expresia receptorului androgen este relativ modestă, în special în comparație cu liniile celulare tumorogene derivate din cancerul de prostată. Linia celulară epitelială RWPE-1 exprimă citokeratinele 8 și 18, ceea ce confirmă linia lor epitelială. În timp ce celulele RWPE-1 exprimă supresori tumorali precum p53 și pRB, reflectând natura lor netumorigenă, expresia markerilor specifici prostatei precum Kallikrein 3 (KLK3) sau PSA este în general scăzută sau absentă în condiții standard de cultură.

În culturi 3D, cum ar fi cele formate în Matrigel, celulele umane RWPE-1 se pot organiza în structuri acinare care amintesc de arhitectura normală a prostatei. În ceea ce privește secreția de PSA (antigen specific prostatei) ca răspuns la stimularea androgenică, celulele RWPE-1 prezintă o reacție mai puțin pronunțată în comparație cu liniile celulare de cancer de prostată. Prin urmare, deși celulele RWPE-1 oferă un model valoros pentru înțelegerea proprietăților de bază ale celulelor epiteliale normale ale prostatei.

Natura non-tumorigenă a RWPE-1 servește drept model pentru studierea tranziției către transformarea tumorigenă și dinamica celulelor canceroase, inclusiv celulele metastatice ale cancerului de prostată și carcinogeneza prostatei. Includerea unor factori precum EGF și hormonul de creștere în condițiile de cultură poate elucidă în continuare căile implicate în hiperplazia prostatică și evoluția către cancerul de prostată. În rezumat, celulele RWPE-1 facilitează o înțelegere cuprinzătoare a cancerului de prostată, de la inițierea acestuia în liniile celulare prostatice până la manifestarea sa la pacienții cu cancer de prostată.

Organism Om

Tissue Prostată

Synonyms RWPE1

Caracteristici

Age 54 de ani

Gender Masculin

Ethnicity Caucazian

Morphology Epitelial

Celule RWPE-1 | 305217**Cell type** Celulă epitelială a prostatei**Growth properties** Aderent**Date de reglementare****Citation** RWPE-1 (număr de catalog Cytion 305217)**Biosafety level** În Germania, RWPE-1 este clasificată la nivelul de biosecuritate 1 sau 2 (BSL-1/2), în funcție de tipul de activitate desfășurată. Linia celulară provine din celule epiteliale de prostată umană transfectate cu o singură copie de HPV-18 și este negativă pentru hepatita B, hepatita C și HIV. Eliberarea de particule virale este puțin probabilă, deoarece HPV-18 necesită celule epiteliale diferențiate pentru replicare, iar o singură copie a genomului nu duce de obicei la formarea de particule. O astfel de eliberare este posibilă doar teoretic în culturile 3D (de exemplu, culturile organotipice sau rafturile), dar este exclusă în culturile monocelulare. Datorită prezenței genomului HPV-18 complet, RWPE-1 este clasificat ca organism din grupa de risc 2 în scopuri de inginerie genetică.**NCBI_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL_3791**Date biomoleculare****Karyotype** Celulele RWPE-1 au o plozie cromozomială diploidă și prezintă variații cromozomiale precum 45, X,-Y și 51, XY.**Manipulare****Culture Medium** K-SFM (Nu furnizăm acest produs; vă rugăm să luați în considerare alți furnizori. Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți nevoie de asistență suplimentară)**Supplements** Suplimentați mediul cu 0,05 mg/mL BPE, 5 ng/mL EGF. Mediul nu trebuie să fie filtrat în întregime. Adăugați BPE și EGF la 10 ml și, după filtrarea sterilă, încorporați acest amestec în mediu.**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Îndepărtați mediul vechi de pe celulele aderente și spălați-le cu PBS care nu conține calciu și magneziu. Pentru flacoanele T25, se utilizează 3-5 ml de PBS, iar pentru flacoanele T75, 5-10 ml. Apoi, se acoperă celulele complet cu Accutase, folosind 1-2 ml pentru flacoanele T25 și 2,5 ml pentru flacoanele T75. Lăsați celulele la incubare la temperatura camerei timp de 8-10 minute pentru a le detașa. După incubare, amestecați ușor celulele cu 10 ml de mediu pentru a le resuspenda, apoi centrifugați la 300xg timp de 3 minute. Aruncați supernatantul, resuspendați celulele în mediu proaspăt și transferați-le în flacoane noi care conțin deja mediu proaspăt.

Celule RWPE-1 | 305217

Freeze medium

Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

Thawing and Culturing Cells

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

Incubation Atmosphere

37°C, 5%_{CO2}, atmosferă umidificată.

Flask Coating

Pentru atașare optimă și viabilitate după decongelare, vă recomandăm să utilizați **flacoane sau plăci acoperite cu collagen**.

Freezing Procedure

Linii celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Celule RWPE-1 | 305217

Shipping Conditions

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității / Profil genetic / HLA

Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.