

Celule L6 | 305231

Informații generale

Description

Linia celulară L6 este un model bine stabilit derivat din țesut muscular scheletic de șobolan. Aceste celule se remarcă prin capacitatea lor de a se diferenția în miotubi, ceea ce le face un instrument valoros pentru studiul dezvoltării, regenerării și fiziologiei musculare. Celulele L6 prezintă o capacitate proliferativă robustă și sunt utilizate în mod obișnuit în cercetarea axată pe biologia celulelor musculare, inclusiv studii privind sinteza proteinelor musculare, hipertrofia și atrofia. Procesul de diferențiere în celulele L6 poate fi indus în condiții de cultură specifice, ducând la formarea de miotuburi multinucleate care imită îndeaproape caracteristicile fibrelor musculare scheletice mature.

În plus față de aplicațiile lor în cercetarea fiziologiei musculare, celulele L6 sunt, de asemenea, utilizate în studiile metabolice, în special cele care implică absorbția glucozei și căile de semnalizare a insulinei. Aceste celule exprimă receptori de insulină și pot fi utilizate pentru investigarea mecanismelor moleculare care stau la baza rezistenței la insulină și a diabetului. Receptivitatea liniei celulare L6 la diverși stimuli metabolici o transformă într-un model ideal pentru explorarea efectelor diferitelor tratamente sau modificări genetice asupra metabolismului muscular. În general, celulele L6 oferă o platformă versatilă și fiabilă pentru a avansa în înțelegerea biologiei musculare și a bolilor metabolice.

Organism Șobolan

Tissue Mușchi scheletic

Synonyms L-6, L-6 mioblast

Caracteristici

Age 1 zi

Gender Masculin

Cell type Myoblast

Growth properties Aderent

Date de reglementare

Citation L6 (număr de catalog Cytion 305231)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 10116

Celule L6 | 305231

CellosaurusAccession CVCL_0385

Date biomoleculare

Protein expression Miozină

Manipulare

Culture Medium DMEM, w: 4,5 g/L glucoză, w: 4 mM L-glutamină, w: 3,7 g/L NaHCO₃, w: 1,0 mM piruvat de sodiu (număr articol Cytion 820300a)**Supplements** Suplimentați mediul cu 10% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Îndepărtați mediul vechi de pe celulele aderente și spălați-le cu PBS care nu conține calciu și magneziu. Pentru flacoanele T25, se utilizează 3-5 ml de PBS, iar pentru flacoanele T75, 5-10 ml. Apoi, se acoperă celulele complet cu Accutase, folosind 1-2 ml pentru flacoanele T25 și 2,5 ml pentru flacoanele T75. Lăsați celulele la incubare la temperatura camerei timp de 8-10 minute pentru a le detașa. După incubare, amestecați ușor celulele cu 10 ml de mediu pentru a le resuspenda, apoi centrifugați la 300xg timp de 3 minute. Aruncați supernatantul, resuspendați celulele în mediu proaspăt și transferați-le în flacoane noi care conțin deja mediu proaspăt.**Freeze medium** Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

Celule L6 | 305231

Thawing and Culturing Cells

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO_2 , atmosferă umidificată.

Flask Coating

Niciuna

Freezing Procedure

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Shipping Conditions

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Celule L6 | 305231

Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității / Profil genetic / HLA

Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.