

## Celule B-LCL-CDG1 | 302012

## Informații generale

## Description

B-LCL-CDG1 este o linie celulară de limfocite B transformată prin EBV derivată de la un pacient diagnosticat cu PMM2-CDG, o tulburare congenitală de glicozilare (CDG). Această tulburare metabolică rară provine din mutații ale genei \*PMM2\*, care codifică fosfomannomutaza 2 (PMM2), o enzimă esențială în calea glicozilării. Mutațiile în \*PMM2\* perturbă sinteza lanțurilor de oligozaharide glicozilate, ducând la glicozilarea defectuoasă a diferitelor glicoproteine și glicozfingolipide din țesuturi și sânge. Afecțiunea se caracterizează prin manifestări multisistemice, afectând adesea funcțiile neurologice, hepatice și endocrine.

Ca linie celulară limfoblastoidă transformată prin EBV, B-LCL-CDG1 oferă un model in vitro valoros pentru studierea consecințelor moleculare și celulare ale deficitului de \*PMM2\*. Această linie celulară poate fi utilizată pentru a studia defectele de glicozilare, activitatea enzimei PMM2 și potențiale intervenții terapeutice, inclusiv corecția genică și suplimentarea substratului. B-LCL-CDG1, alături de alte linii celulare derivate de la pacienții cu CDG, reprezintă o resursă esențială pentru înțelegerea fiziopatologiei CDG și pentru evaluarea unor noi strategii de tratament pentru aceste afecțiuni.

**Organism** Om

**Tissue** Sânge periferic

**Disease** Tulburări congenitale de glicozilare

**Applications** Genotiparea efectelor CDG în celulele imunitare. Teste funcționale (de exemplu, antigene de suprafață ale celulelor B). Testarea medicamentelor citotoxice. Analiza mutațională. Analiza mecanismelor apoptotice. Tipizarea HLA. Impactul glicozilării defectuoase a diferitelor glicoproteine celulare asupra diverselor funcții.

## Caracteristici

**Gender** Femei

**Ethnicity** Caucazian

**Morphology** Celule rotunde

**Cell type** Limfocitele B

**Growth properties** Suspensie, cluster

## Date de reglementare

**Citation** B-LCL-CDG1 (număr de catalog Cytion 302012)

## Celule B-LCL-CDG1 | 302012

**Biosafety level** 2

**NCBI\_TaxID** 9606

### Date biomoleculare

**Viruses** Transformant: EBV

### Manipulare

**Culture Medium** RPMI 1640, cu: 2,0 mM glutamină stabilă, cu: 2,0 g/L NaHCO<sub>3</sub> (număr articol Cytion 820700a)

**Supplements** Suplimentați mediul cu 10% FBS inactivat termic

**Subculturing** Mențineți culturile adăugând sau înlocuind periodic mediul. Inițiați culturile cu o densitate de  $2 \times 10^5$  celule/ml și mențineți concentrația celulară în intervalul  $1 \times 10^5$  până la  $5 \times 10^5$  celule/ml pentru o creștere optimă.

**Fluid renewal** Odată ce culoarea medie s-a transformat în galben

**Freeze medium** Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

## Celule B-LCL-CDG1 | 302012

### Thawing and Culturing Cells

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

### Incubation Atmosphere

37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , atmosferă umidificată.

### Flask Coating

Pentru atașare optimă și viabilitate după decongelare, vă recomandăm să utilizați **flacoane sau plăci acoperite cu colagen**.

### Freezing Procedure

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

## Celule B-LCL-CDG1 | 302012

### Shipping Conditions

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

### Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

## Controlul calității / Profil genetic / HLA

### Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.