Product sheet

Celule UM-SCC-128 | 305726

Informații generale

Description	UM-SCC-128 este o linie celulară umană de HNSCC din panoul UM-SCC al Universității din Michigan, care se dezvoltă sub formă de monostrat aderent cu morfologie de tip epitelial. Aceasta face parte din seria UM-SCC cu numere mai mari și oferă un model pentru studii preclinice comparative privind HNSCC. Se poate utiliza în cercetarea HNSCC, în studiile privind sensibilitatea și rezistența la medicamente, în studiile privind răspunsul la radiații și în experimentele comparative cu panoul multilinie UM-SCC. Este adecvată pentru screeningul farmacologic și pentru modelele de xenografă.
Organism	Om
Tissue	Cap și gât, cavitatea bucală
Disease	Carcinom cu celule scuamoase la nivelul capului și gâtului (HNSCC)
Metastatic site	Localizarea tumorii primare (cap și gât)
Applications	Cercetări privind HNSCC; sensibilitatea și rezistența la medicamente; răspunsul la radioterapie; studii ale grupului UM-SCC; modele de xenografă

Caracteristici

Age	Vârsta nespecificată
Gender	Sex nespecificat
Ethnicity	Etnie nespecificată
Morphology	De tip epitelial
Cell type	Celule epiteliale
Growth properties	Aderent

Date de reglementare

Citation	UM-SCC-128 (număr de catalog Cytion 305726)
Biosafety level	1

Celule UM-SCC-128 | 305726

NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	Nealocat
GMO Status	Fără modificări genetice; linie celulară HNSCC de tip sălbatic

Date biomoleculare

Manipulare

Culture Medium	DMEM, w: 4,5 g/L glucoză, w: 4 mM L-glutamină, w: 3,7 g/L NaHCO3, w: 1,0 mM piruvat de sodiu (număr articol Cytion 820300a)
Supplements	Adăugați în mediu 10% FBS și 1% aminoacizi neesențiali (NEAA)
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	aproximativ 24–48 de ore
Subculturing	Se îndepărtează mediul, se spală cu PBS fără calciu și magneziu, se acoperă cu Accutase, se incubează 8–10 minute la temperatura camerei, se resuspende în mediu, se centrifughează la 300×g timp de 3 minute, se elimină supernatantul, se resemănează în mediu proaspăt.
Split ratio	de la 1 la 5
Seeding density	1 până la 3×10^4 celule/cm^2
Fluid renewal	La fiecare 2 sau 3 zile
Freeze medium	Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezgheţare.

Celule UM-SCC-128 | 305726

Thawing and Culturing Cells	1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului. 2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată. 3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață. 4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere. 5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor. 6. Se centrifughează amestecul la 200 x g timp de 5 minute, se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare. 7. Se urmează procedura descrisă la secțiunea Recuperare după decongelare
Incubation Atmosphere	37°C, 5%$_{CO2}$, atmosferă umidificată.
Shipping Conditions	Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.
Storage Conditions	Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității și analiza moleculară