

Celule B-LCL-HROC113 | 300898**Informații generale****Description**

B-LCL-HROC113 este o linie celulară limfoblastoidă umană imortalizată cu virusul Epstein-Barr (EBV), obținută din limfocite B izolate din țesutul tumoral sau din sângele periferic al unui pacient adult. Celulele au fost generate prin infectarea ex vivo cu supernatantul conținând EBV derivat din linia celulară B95/8 marmoset în prezența ciclosporinei A pentru a suprima creșterea celulelor T și NK. După câteva săptămâni de cultură, s-a obținut o creștere limfoblastoidă stabilă, rezultând o populație de celule B monoclonale sau oligoclonale în continuă proliferare, adecvată pentru expansiunea in vitro pe termen lung.

Din punct de vedere imunofenotipic, B-LCL-HROC113 prezintă un profil de celule B mature și activate, caracterizat prin expresia CD19 și CD20, împreună cu niveluri ridicate de markeri de activare și maturare, cum ar fi CD23 și CD80. Expresia puternică a moleculelor MHC de clasa I și clasa II indică capacitatea de prezentare a antigenului păstrată. În funcție de clona individuală, se poate observa o expresie variabilă a markerilor asociați diferențierii, cum ar fi CD27, CD38 sau CD138, reflectând diferite stadii de maturare a celulelor B. Celulele sunt negative pentru markerii celulelor T, confirmând specificitatea liniei celulare.

Din punct de vedere funcțional, B-LCL-HROC113 secretă imunoglobulină de un izotip definit (de exemplu, IgG, IgM sau IgA), care rămâne stabilă în timpul culturii prelungite. Anticorpii secretați pot fi colectați din supernatantul culturii și utilizați pentru aplicații în aval, inclusiv teste de legare a antigenelor, studii de recunoaștere a celulelor tumorale sau identificarea antigenelor asociate bolii. Ca model de celule B imortalizate cu EBV, B-LCL-HROC113 oferă o platformă in vitro robustă pentru investigarea răspunsurilor imune umorale, activării și diferențierii celulelor B și mecanismelor mediate de anticorpi în contextul imunologiei tumorale sau al răspunsurilor imune sistemice.

Organism Om**Tissue** Sânge periferic**Disease** Carcinom**Synonyms** B-LCL CO113, Bc HROC113**Caracteristici****Age** 41 de ani**Gender** Femei**Ethnicity** Caucazian**Morphology** Celule rotunde**Cell type** B limfoblast

Celule B-LCL-HROC113 | 300898

Growth properties Suspensie

Date de reglementare

Citation B-LCL-HROC113 (număr de catalog Cytion 300898)

Biosafety level 2

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_YD52

Date biomoleculare

Surface antigens CD19

Viruses Transformant: EBV

Manipulare

Culture Medium RPMI 1640, cu: 2,0 mM glutamină stabilă, cu: 2,0 g/L NaHCO₃ (număr articol Cytion 820700a)

Supplements Suplimentați mediul cu 10% FBS inactivat termic

Subculturing Omogenizați ușor suspensia celulară din balon prin pipetare în sus și în jos, apoi prelevați o probă reprezentativă pentru a determina densitatea celulară pe ml. Diluați suspensia pentru a obține o concentrație celulară de 1×10^5 celule/ml cu mediu de cultură proaspăt și distribuiți suspensia ajustată în baloane noi pentru cultivare ulterioară.

Freeze medium Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

Celule B-LCL-HROC113 | 300898

Thawing and Culturing Cells

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO_2 , atmosferă umidificată.

Flask Coating

Pentru atașare optimă și viabilitate după decongelare, vă recomandăm să utilizați **flacoane sau plăci acoperite cu colagen**.

Freezing Procedure

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Celule B-LCL-HROC113 | 300898

Shipping Conditions

Liniiile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității / Profil genetic / HLA

Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.

Alele HLA

A*: '01:01:01, '02:01:01G
B*: '08:01:01, '38:01:01
C*: '07:01:01, '12:03:01
DRB1*: '07:01:01, '15:01:01
DQA1*: '01:02:01, '02:01:01
DQB1*: '02:02:01, '06:02:01
DPB1*: '04:01:01
E: '01:01:01