

Celule WI-38 | 300428

Informații generale

Description

Vă rugăm să rețineți: Linia celulară WI-38 nu mai este disponibilă pentru cumpărare. Stocul nostru a ajuns la senescență și, prin urmare, nu mai poate fi vândut. Cu toate acestea, continuăm să oferim o variantă imortalizată a acestei linii celulare, WI 38VA13 Subline 2RA (nr. catalog 300421).

Linia celulară WI-38, derivată din țesutul pulmonar fetal al unui făt în vârstă de 3 luni obținut în urma unui avort electiv în Suedia în 1962, reprezintă un reper în știința medicală, în special în producția de vaccinuri. Celulele WI-38 au jucat un rol crucial în dezvoltarea de vaccinuri pentru o gamă largă de boli infecțioase virale, inclusiv poliomielita, rujeola, oreionul, rubeola, varicela, herpes zoster, adenovirusul, rabia și hepatita A, reducând astfel semnificativ morbiditatea asociată acestor afecțiuni.

În special, celulele WI-38 au fost utilizate la producerea mai multor vaccinuri esențiale, cum ar fi vaccinurile Merck împotriva rubeolei și hepatitei A, vaccinul antirabic Imovax al Sanofi Pasteur și vaccinul împotriva adenovirusului utilizat de armata americană, subliniind rolul lor esențial în sănătatea publică. Aceste celule, caracterizate prin tipul lor celular fibroblast și biocompatibilitate excelentă, oferă un mediu optim pentru cultivarea virusilor și producerea vaccinurilor virale umane.

Fiind o linie celulară umană diploidă cu o durată de viață limitată de aproximativ 50 de dublări ale populației și un timp de dublare de aproximativ 24 de ore, celulele WI-38 au fost utilizate pe scară largă în cercetarea biologică, inclusiv în studiul îmbătrânirii celulare, al cancerului și al geneticii. De asemenea, celulele WI-38 au jucat un rol esențial în domeniul virusologiei, în special în sprijinirea cultivării și studierii virusilor umani. Aceste celule oferă un mediu propice pentru cultivarea virusilor extrași din specimene clinice, ceea ce este esențial pentru dezvoltarea vaccinurilor și pentru avansarea înțelegerii comportamentelor și geneticii virale.

În rezumat, celulele WI-38, cu aplicațiile lor extinse în producția de vaccinuri, rămân o piatră de temelie în domeniul virusologiei. Contribuția lor la dezvoltarea vaccinurilor derivate din celule și avansarea celulelor primare în cercetarea științifică subliniază rolul lor neprețuit în îmbunătățirea sănătății umane la nivel mondial.

Organism Om

Tissue Plămân

Synonyms Wi-38, WI38, Institutul Wistar-38, AG06814E, AG06814G, AG06814H, AG06814-J, AG06814J, AG06814-M, AG06814-N

Caracteristici

Age 3 luni de gestație

Gender Femei

Ethnicity Caucazian

Morphology De tip epitelial

Celule WI-38 | 300428

Cell type Fibroblast**Growth properties** Aderent

Date de reglementare

Citation WI 38 (număr de catalog Cytion 300428)**Biosafety level** 1**NCBI_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL_0579

Date biomoleculare

Manipulare

Culture Medium EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamină, w: 2,2 g/L NaHCO₃, w: EBSS (număr articol Cytion 820100a)**Supplements** Suplimentați mediul cu 10% FBS și 1% NEAA**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Îndepărtați mediul vechi de pe celulele aderente și spălați-le cu PBS care nu conține calciu și magneziu. Pentru flacoanele T25, se utilizează 3-5 ml de PBS, iar pentru flacoanele T75, 5-10 ml. Apoi, se acoperă celulele complet cu Accutase, folosind 1-2 ml pentru flacoanele T25 și 2,5 ml pentru flacoanele T75. Lăsați celulele la incubare la temperatura camerei timp de 8-10 minute pentru a le detașa. După incubare, amestecați ușor celulele cu 10 ml de mediu pentru a le resuspenda, apoi centrifugați la 300xg timp de 3 minute. Aruncați supernatantul, resuspendați celulele în mediu proaspăt și transferați-le în flacoane noi care conțin deja mediu proaspăt.**Freeze medium** Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

Celule WI-38 | 300428

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

**Incubation
Atmosphere**37°C, 5% CO_2 , atmosferă umidificată.**Flask Coating**

Niciuna

**Freezing
Procedure**

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

**Shipping
Conditions**

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Celule WI-38 | 300428

Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității / Profil genetic / HLA

Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.

Alele HLA

A*: '02:05:01, '68:01:01

B*: '08:01:01, '58:01:01

C*: '07:01:01, '07:18:01

DRB1*: '11:01:01, '13:02:01

DQA1*: '01:02:01, '05:05:01

DQB1*: '03:01:01, '06:09:01

DPB1*: '03:01:01, '04:01:01

E: '01:01:01, '01:03:01