

## Celule Hepa 1-6 | 400474

## Informații generale

## Description

Linia celulară Hepa 1-6 este un model bine caracterizat derivat dintr-un hepatom indus la un șoarece adult. Această linie celulară este utilizată în mod obișnuit în cercetarea biomedicală, cu accent pe studiul cancerului hepatic, metabolismului hepatic și toxicologiei. Celulele sunt de morfologie epitelială și prezintă un fenotip de carcinom hepatocelular nediferențiat. Hepa 1-6 este deosebit de valoroasă pentru investigarea căilor biochimice implicate în funcția hepatică și a mecanismelor celulare care stau la baza hepatocarcinogenezei.

Celulele Hepa 1-6 sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a fi cultivate ușor și de a menține o creștere și o reproducere stabile în condiții standard de laborator. Ele exprimă mai multe enzime citocrom P450, ceea ce le face un instrument excelent pentru studii farmacologice și toxicologice. Aceste celule sunt, de asemenea, utilizate pentru a explora reglarea expresiei genelor în celulele hepatice și pentru a înțelege impactul diferitelor substanțe asupra funcției hepatice. Datorită naturii lor robuste și relevanței pentru bolile hepatice umane, Hepa 1-6 continuă să fie o resursă esențială în domeniul cercetării bolilor hepatice.

**Organism** Șoarece

**Tissue** Ficat

**Disease** Carcinom hepatocelular

**Synonyms** HEPA 1-6, Hepa-1-6, Hepa1-6

## Caracteristici

**Breed/Subspecies** C57/L

**Gender** Femei

**Morphology** De tip epitelial

**Growth properties** Aderent

## Date de reglementare

**Citation** Hepa 1-6 (număr de catalog Cytion 400474)

**Biosafety level** 1

**NCBI\_TaxID** 10090

## Celule Hepa 1-6 | 400474

CellosaurusAccession CVCL\_0327

## Date biomoleculare

**Tumorigenic** Da, la șoarecii C57BL/6.**Viruses** Virusul Ectromelia (variola de șoarece): Negativ.**Products** Albumină, alfa-fetoproteină (AFP, alfa-fetoproteină), albumină, alfa antitripsină (alfa-1-antitripsină), amilază

## Manipulare

**Culture Medium** DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L Glucoză, w: 2,5 mM L-Glutamină, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM Piruvat de sodiu, w: 1,2 g/L NaHCO<sub>3</sub> (număr articol Cytion 820400a)**Supplements** Suplimentați mediul cu 10% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Doubling time** 25 de ore**Subculturing** Îndepărtați mediul vechi de pe celulele aderente și spălați-le cu PBS care nu conține calciu și magneziu. Pentru flacoanele T25, se utilizează 3-5 ml de PBS, iar pentru flacoanele T75, 5-10 ml. Apoi, se acoperă celulele complet cu Accutase, folosind 1-2 ml pentru flacoanele T25 și 2,5 ml pentru flacoanele T75. Lăsați celulele la incubare la temperatura camerei timp de 8-10 minute pentru a le detașa. După incubare, amestecați ușor celulele cu 10 ml de mediu pentru a le resuspenda, apoi centrifugați la 300xg timp de 3 minute. Aruncați supernatantul, resuspendați celulele în mediu proaspăt și transferați-le în flacoane noi care conțin deja mediu proaspăt.**Seeding density**  $1 \times 10^4$  celule/cm<sup>2</sup>**Fluid renewal** de 2 până la 3 ori pe săptămână**Post-Thaw Recovery** Bine. Lăsați celulele să se refacă după procesul de congelare timp de 24 până la 48 de ore.**Freeze medium** Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

## Celule Hepa 1-6 | 400474

### Thawing and Culturing Cells

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

### Incubation Atmosphere

37°C, 5%  $\text{CO}_2$ , atmosferă umidificată.

### Flask Coating

Niciuna

### Freezing Procedure

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

### Shipping Conditions

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

## Celule Hepa 1-6 | 400474

### Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

## Controlul calității / Profil genetic / HLA

### Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.