

## HK-CRISPR-mEGFP-Nup153-celler | 300656

## Allmän information

## Description

HK-CRISPR-mEGFP-Nup153-cellinjen är en human cellmodell som konstruerats för att studera dynamiken i kärnporskomplexet (NPC). Med hjälp av CRISPR-Cas9 integrerar denna cellinje en mEGFP-märkning (monomeric enhanced green fluorescent protein) i Nup153-genen, en kritisk komponent i NPC. Detta möjliggör visualisering i realtid av NPC:s beteende i levande celler.

Denna cellinje är användbar för att studera NPC:s uppbyggnad, nedmontering och deras roll i nukleocytoplasmisk transport, mRNA-export och kärnhöljets integritet. Den exakta genomredigeringen med CRISPR-teknik säkerställer tillförlitliga resultat, vilket gör denna cellinje värdefull för att förstå NPC-funktioner under både normala förhållanden och sjukdomstillstånd.

**Organism** Människan

**Tissue** Endocervix

**Disease** Adenocarcinom

## Egenskaper

**Age** 30 år

**Gender** Kvinna

**Ethnicity** Afroamerikan

**Morphology** Epitelliknande celler med mosaikstensform

**Growth properties** Följsam

## Lagstadgade uppgifter

**Citation** HK-CRISPR-mEGFP-Nup153 (Cytion katalognummer 300656)

**Biosafety level** 1

**NCBI\_TaxID** 9606

**Depositor** Ellenberg-laboratoriet (EMBL)

**HK-CRISPR-mEGFP-Nup153-celler | 300656**

**GMO Status** GMO-S1: Denna HeLa Kyoto-linje innehåller en CRISPR-konstruerad mEGFP-fusion vid Nup153-lokuset för avbildning av kärnporskomplexet. Denna klassificering gäller endast i Tyskland och kan skilja sig åt på andra håll.

**Biomolekylära data**

**Protein expression** Nup153, mEGFP-tag

**Hantering**

**Culture Medium** DMEM, w: 4,5 g/L glukos, w: 4 mM L-glutamin, w: 3,7 g/L NaHCO<sub>3</sub>, w: 1,0 mM natriumpyruvat (Cytion artikelnummer 820300a)

**Supplements** Komplettera mediet med 10% FBS

**Dissociation Reagent** Accutase

**Subculturing** Ta bort det gamla mediet från de adherenta cellerna och tvätta dem med PBS som saknar kalcium och magnesium. Använd 3-5 ml PBS för T25-kolvar och 5-10 ml för T75-kolvar. Täck sedan cellerna helt med Accutase, använd 1-2 ml för T25-kolvar och 2,5 ml för T75-kolvar. Låt cellerna inkubera i rumstemperatur i 8-10 minuter så att de lossnar. Efter inkubationen, blanda cellerna försiktigt med 10 ml medium för att resuspendera dem och centrifugera sedan vid 300xg i 3 minuter. Kassera supernatanten, resuspendera cellerna i färskt medium och överför dem till nya kolvar som redan innehåller färskt medium.

**Freeze medium** Som kryokonservationsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

## HK-CRISPR-mEGFP-Nup153-celler | 300656

### Thawing and Culturing Cells

1. Bekräfta att flaskan är djupfryst vid leverans, eftersom cellerna skickas på torris för att bibehålla optimala temperaturer under transporten.
2. Vid mottagandet ska du antingen förvara kryovialen omedelbart vid temperaturer under  $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$  för att säkerställa att cellernas integritet bevaras, eller gå vidare till steg 3 om omedelbar odling krävs.
3. Vid omedelbar odling ska injektionsflaskan snabbt tinas genom att den sänks ned i ett  $37\text{ }^{\circ}\text{C}$  vattenbad med rent vatten och ett antimikrobiellt medel och omrörs försiktigt i 40-60 sekunder tills en liten isklump återstår.
4. Utför alla efterföljande steg under sterila förhållanden i en flödeshuv och desinficera kryovialerna med 70 % etanol innan de öppnas.
5. Öppna försiktigt den desinficerade flaskan och överför cellsuspensionen till ett 15 ml centrifugrör som innehåller 8 ml rumstempererat odlingsmedium och blanda försiktigt.
6. Centrifugera blandningen vid  $300 \times g$  i 3 minuter för att separera cellerna och kassera försiktigt supernatanten som innehåller resterande frysmedium.
7. Resuspendera försiktigt cellpelleten i 10 ml färskt odlingsmedium. För adherenta celler, fördela suspensionen mellan två T25-kulturkolv; för suspensionskulturer, överför allt medium till en T25-kolv för att främja effektiv cellinteraktion och tillväxt.
8. Följ fastställda subkulturprotokoll för fortsatt tillväxt och underhåll av cellinjen, vilket säkerställer tillförlitliga experimentella resultat.

### Incubation Atmosphere

$37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 5%  $\text{CO}_2$ , befuktad atmosfär.

### Flask Coating

Ingen

### Freezing Procedure

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

### Shipping Conditions

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka  $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$  under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

## HK-CRISPR-mEGFP-Nup153-celler | 300656

### Storage Conditions

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

## Kvalitetskontroll / Genetisk profil / HLA

### Sterility

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik.

För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.