

Bunky HCC78 | 302156**Všeobecné informácie****Description**

HCC78 je bunková línia odvodená z primárneho nádoru adenokarcinómu pľúc, konkrétne podtypu známeho ako mucinózny bronchioloalveolárny karcinóm. Táto bunková línia bola vytvorená z dospelého mužského pacienta. Bunky HCC78 sa vyznačujú najmä tým, že obsahujú jedinečnú chromozomálnu prestavbu zahŕňajúcu gény ROS1 a SLC34A2, ktorej výsledkom je fúzny proteín SLC34A2-ROS1. Tento fúzny proteín sa podieľa na onkogénnych signálnych dráhach, vďaka čomu je HCC78 cenným modelom na štúdium molekulárnych mechanizmov rakoviny pľúc s fúznym proteínom ROS1 a na testovanie cielených terapií proti ROS1.

V rámci výskumu sa HCC78 vo veľkej miere využíva na skúmanie účinnosti a mechanizmu účinku inhibítorov ROS1. Tieto štúdie preukázali užitočnosť bunkovej línie pri predklinickom hodnotení citlivosti na lieky, mechanizmov rezistencie a bunkových dráh ovplyvnených aktivitou ROS1. Bunková línia rastie adherentne a vykazuje epitelovú morfológiu, ktorá je charakteristická pre bronchioloalveolárne nádory. Genetické a fenotypové vlastnosti HCC78 z nej robia základný nástroj pre výskum rakoviny pľúc, najmä pre výskum zameraný na cielené terapie a personalizovanú medicínu pri liečbe ROS1-pozitívnych nádorov.

Organism Ľudské**Tissue** Pleurálny výpotok**Disease** Adenokarcinóm**Synonyms** HCC-78, HCC0078, Hamon Cancer Center 78**Charakteristika****Age** 65 rokov**Gender** Muži**Ethnicity** Európska**Growth properties** Monovrstva, priliehajúca**Regulačné údaje****Citation** HCC78 (katalógové číslo Cytion 302156)**Biosafety level** 1**NCBI_TaxID** 9606

Bunky HCC78 | 302156

CellosaurusAccession CVCL_2061

Biomolekulárne údaje**Spracovanie**

Culture Medium RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO₃ (číslo výrobu Cytion 820700a)

Supplements Doplníte médium o 10 % FBS

Dissociation Reagent Accutase

Subculturing Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstredujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Freeze medium Ako kryokonzervačné médium používame kompletne rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie regenerácie a zníženie stresu spôsobeného kryom.

Bunky HCC78 | 302156**Thawing and
Culturing Cells**

1. Overte si, že injekčná liekovka zostane pri doručení hlboko zmrazená, pretože bunky sa prepravujú na suchom ľade, aby sa počas prepravy udržala optimálna teplota.
2. Po prijatí buď okamžite uskladnite kryovialku pri teplote nižšej ako -150 °C, aby ste zabezpečili zachovanie bunkovej integrity, alebo prejdite na krok 3, ak je potrebná okamžitá kultivácia.
3. V prípade okamžitej kultivácie injekčnú liekovku rýchlo rozmrazte ponorením do vodného kúpeľa s teplotou 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálnym prostriedkom, pričom ju jemne miešajte 40 - 60 sekúnd, kým nezostane malý ľadový chumáč.
4. Všetky ďalšie kroky vykonajte v sterilných podmienkach v prietokovom digestore a pred otvorením kryovialku dezinfikujte 70 % etanolom.
5. Opatrne otvorte dezinfikovanú fľaštičku a preneste bunkovú suspenziu do 15 ml centrifugačnej skúmavky obsahujúcej 8 ml kultivačného média s izbovou teplotou a jemne premiešajte.
6. Zmes odstreďujte pri 300 x g počas 3 minút, aby sa bunky oddelili, a opatrne zlikvidujte supernatant obsahujúci zvyšky zmrazovacieho média.
7. Pelet buniek jemne resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačného média. V prípade adherentných buniek rozdeľte suspenziu medzi dve kultivačné banky T25; v prípade suspenzných kultúr preneste všetko médium do jednej banky T25, aby ste podporili účinnú interakciu a rast buniek.
8. Dodržiavajte zavedené subkultivačné protokoly na nepretržitý rast a udržiavanie bunkovej línie, čím sa zabezpečia spoľahlivé výsledky experimentov.

**Incubation
Atmosphere**

37 °C, 5 % CO_2 , zvlhčená atmosféra.

Flask Coating

Žiadne

**Freezing
Procedure**

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

**Shipping
Conditions**

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

Bunky HCC78 | 302156

Storage Conditions

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Kontrola kvality / Genetický profil / HLA

Sterility

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplazmiem založených na luminiscencii.

Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.