

Ca bunky AN3 | 300119

Všeobecné informácie

Description

Bunková línia An3 Ca je odvodená od ľudského adenokarcinómu endometria, čo je typ rakoviny pochádzajúci z výstelky maternice. Táto bunková línia je negatívna na estrogénové receptory (ER-) a pri hodnotení in vivo vykazuje agresívny nádorový potenciál. Bunky An3 Ca sa vo veľkej miere používajú vo výskume zameranom na pochopenie molekulárnych a bunkových mechanizmov, ktoré sú základom progresie rakoviny endometria, vrátane štúdií proliferácie rakovinových buniek, metastázovania a reakcie na terapeutické látky.

Pre bunky An3 Ca je charakteristická epitelová morfológia a využívajú sa na štúdium vplyvu rôznych genetických a environmentálnych faktorov na správanie rakovinových buniek. Výskum s použitím tejto bunkovej línie prispel k identifikácii potenciálnych terapeutických cieľov a k pochopeniu mechanizmov rezistencie voči bežnej liečbe. Slúžia ako cenný model na hodnotenie nových liekov alebo liečebných stratégií, ktoré by mohli byť účinné proti agresívnym formám rakoviny endometria.

Celkovo je bunková línia An3 Ca dôležitá pre rozvoj vedeckých poznatkov o adenokarcinóme endometria a ponúka poznatky, ktoré by mohli viesť k účinnejším zásahom pri tomto náročnom a často smrteľnom ochorení.

Organism Ludské

Tissue Maternica, endometrium

Disease Adenokarcinóm

Synonyms AN3_CA, AN3-CA, AN3 Ca, AN3CA, AN-3, AN3, Acanthosis Nigricans 3. pokus-Carcinóm

Charakteristika

Age 55 rokov

Gender Ženy

Ethnicity Kaukazský

Morphology Epitelu podobné

Cell type Epitelové

Growth properties Adherent

Regulačné údaje

Ca bunky AN3 | 300119

Citation AN3 Ca (katalógové číslo Cytion 300119)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_0028

Biomolekulárne údaje

Isoenzymes PGM3, 1-2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1-2, GLO-1, 2, G6PD, B,

Tumorigenic Áno, na nahých myšiach. Produkuje nediferencovaný malígny nádor, tiež s nízkou frekvenciou (22 %) v lícnom vaku škrečkov liečených kortizónom

Ploidy status Aneuploidný, produkt frekvencie fenotypu: 0.0054

Spracovanie

Culture Medium EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamín, w: 2,2 g/L NaHCO₃, w: EBSS (Cytion číslo článku 820100a)

Supplements Doplníte médium o 10% FBS a 1% NEAA

Dissociation Reagent Accutase

Doubling time 45 až 50 hodín

Subculturing Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstredíte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Seeding density Odporúča sa počiatočná hustota osivovania 3 až 4 x 10⁴ buniek/cm². Neskôr 2 x 10⁴ buniek/cm² vytvorí konfluentnú vrstvu za 4 až 5 dní.

Fluid renewal 2 až 3-krát týždenne

Ca bunky AN3 | 300119**Post-Thaw Recovery** Do 24 až 48 hodín**Freeze medium**

Ako kryokonzervačné médium používame kompletne rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie regenerácie a zníženie stresu spôsobeného kryom.

Thawing and Culturing Cells

1. Overte si, že injekčná liekovka zostane pri doručení hlboko zmrazená, pretože bunky sa prepravujú na suchom ľade, aby sa počas prepravy udržala optimálna teplota.
2. Po prijatí buď okamžite uskladnite kryovialku pri teplote nižšej ako -150 °C, aby ste zabezpečili zachovanie bunkovej integrity, alebo prejdite na krok 3, ak je potrebná okamžitá kultivácia.
3. V prípade okamžitej kultivácie injekčnú liekovku rýchlo rozmrazte ponorením do vodného kúpeľa s teplotou 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálnym prostriedkom, pričom ju jemne miešajte 40 - 60 sekúnd, kým nezostane malý ľadový chumáč.
4. Všetky ďalšie kroky vykonajte v sterilných podmienkach v prietokovom digestore a pred otvorením kryovialku dezinfikujte 70 % etanolom.
5. Opatrne otvorte dezinfikovanú fľaštičku a preneste bunkovú suspenziu do 15 ml centrifugačnej skúmavky obsahujúcej 8 ml kultivačného média s izbovou teplotou a jemne premiešajte.
6. Zmes odstreďujte pri 300 x g počas 3 minút, aby sa bunky oddelili, a opatrne zlikvidujte supernatant obsahujúci zvyšky zmrazovacieho média.
7. Pelet buniek jemne resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačného média. V prípade adherentných buniek rozdeľte suspenziu medzi dve kultivačné banky T25; v prípade suspenzných kultúr preneste všetko médium do jednej banky T25, aby ste podporili účinnú interakciu a rast buniek.
8. Dodržiavajte zavedené subkultivačné protokoly na nepretržitý rast a udržiavanie bunkovej línie, čím sa zabezpečia spoľahlivé výsledky experimentov.

Incubation Atmosphere37 °C, 5 %_{CO2}, zvlhčená atmosféra.**Flask Coating**

Žiadne

Ca bunky AN3 | 300119

Freezing Procedure

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

Shipping Conditions

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

Storage Conditions

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Kontrola kvality / Genetický profil / HLA

Sterility

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplazmiem založených na luminiscencii.

Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Alely HLA

A*: '03:01:01
B*: '44:02:01, '57:01:01
C*: '05:01:01, '06:02:01
DRB1*: '04:01:01G, '16:01:01
DQA1*: '01:02:02, '03:01:01
DQB1*: '03:02:01, '05:02:01
DPB1*: '05:01:01G, '13:01:01G
E: '01:03:02