

bunky 3T3-L1 | 400107**Všeobecné informácie****Description**

bunky 3T3-L1 sú klonálnou líniou preadipocytov odvodených z myších embryonálnych fibroblastov. Tieto bunky sa stali široko používaným in vitro modelom na štúdium procesu adipogenézy vrátane adipogenézy a lipogenézy, čo je diferenciácia preadipocytov na adipocyty (tukové bunky). Názov "3T3" sa vzťahuje na protokol prenosu (T), ktorý zahŕňal prenos buniek každé 3 dni, a "L1" označuje konkrétny klon, ktorý bol izolovaný.

Na začiatku vykazujú bunky 3T3-L1 morfológiu podobnú fibroblastom, ale po indukcii diferenciácie buniek 3T3-L1 sa bunky 3T3-L1 menia z preadipocytového stavu na zrelé adipocyty a hromadia kvapôčky lipidov, čo je charakteristickým znakom obezity a metabolického syndrómu. Proces diferenciácie z preadipocytov 3T3-L1 na adipocyty 3T3-L1 sa spúšťa špecifickým koktailom induktorov, ktorý zvyčajne zahŕňa dexametazón, 3-izobutyl-1-metylxantín (IBMX) a inzulín.

Keď adipocyty 3T3-L1 získajú vlastnosti zrelých adipocytov, začnú exprimovať gény, ktoré sú kľúčové pre funkciu adipocytov, ako sú gény kódujúce enzýmy zapojené do metabolizmu mastných kyselín a hormóny ako leptín a adiponektín, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii chuti do jedla, energetickej rovnováhy a citlivosti na inzulín. Štúdium transformácií buniek 3T3-L1 zlepšuje naše chápanie adipogenézy a obezity a chorôb súvisiacich s tukmi, ako je napríklad diabetes 2. typu, tým, že odhaľuje, ako hromadenie lipidov v adipocytoch vedie k bunkovej dysfunkcii a širším metabolickým problémom.

Okrem toho je bunková línia 3T3-L1 nápomocná pri skúmaní vplyvu rôznych látok na správanie adipocytov, ako je napríklad účinok farmakologických látok na lipolýzu alebo protizápalové vlastnosti niektorých diét, ktoré môžu zabrániť inzulínovej rezistencii.

bunky 3T3-L1 sa vo veľkej miere používajú na štúdium molekulárnych a bunkových mechanizmov, ktoré sú základom diferenciácie adipocytov, citlivosti na inzulín, metabolizmu lipidov a účinkov rôznych výživových a farmakologických látok na tieto procesy. Vzhľadom na ich schopnosť diferencovať sa na adipocyty a jednoduchú kultiváciu in vitro poskytujú bunky 3T3-L1 cenný modelový systém pre výskum obezity a diabetu, ako aj pre objavovanie nových terapeutických cieľov súvisiacich s metabolickými ochoreniami

Organism Myš**Tissue** Embryonálne**Applications** bunky 3T3-L1 sa používajú ako modelový systém na pochopenie molekulárnych mechanizmov, ktoré regulujú adipogenézu a metabolizmus lipidov, a využívajú sa vo výskume súvisiacom s obezitou, cukrovkou a metabolickými ochoreniami. Sú tiež životaschopným hostiteľom pre transfekciu.**Synonyms** 3T3 L1, 3T3L1, 3T3-L1 ad, NIH-3T3-L1, NIH3T3-L1**Charakteristika****Breed/Subspecies** Švajčiarsky albín**Age** Embryo

bunky 3T3-L1 | 400107**Gender** Muži**Morphology** Fibroblastom podobné**Growth properties** Adherent**Regulačné údaje****Citation** 3T3-L1 (katalógové číslo Cytion 400107)**Biosafety level** 1**NCBI_TaxID** 10090**CellosaurusAccession** CVCL_0123**Biomolekulárne údaje****Tumorigenic** Nie**Virus susceptibility** Vírus leukémie myší, vírus sarkómu myší, vezikulárna stomatitída, vakcína, herpes simplex, N-tropné onkornavírusy C**Products** Inzulín, kolagén, triglyceridy**Ploidy status** Aneuploidné**Karyotype** 2n=40**Spracovanie****Culture Medium** DMEM, w: 4,5 g/l glukózy, w: 4 mM L-glutamínu, w: 3,7 g/l NaHCO₃, w: 1,0 mM pyruvátu sodného (číslo výrobku Cytion 820300a)**Supplements** Doplníte médium o 10 % FBS**Dissociation Reagent** Accutase

bunky 3T3-L1 | 400107

Subculturing Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstredujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Freeze medium Ako kryokonzervačné médium používame kompletne rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie regenerácie a zníženie stresu spôsobeného kryom.

Thawing and Culturing Cells

1. Overte si, že injekčná liekovka zostane pri doručení hlboko zmrazená, pretože bunky sa prepravujú na suchom ľade, aby sa počas prepravy udržala optimálna teplota.
2. Po prijatí buď okamžite uskladnite kryovialku pri teplote nižšej ako -150 °C, aby ste zabezpečili zachovanie bunkovej integrity, alebo prejdite na krok 3, ak je potrebná okamžitá kultivácia.
3. V prípade okamžitej kultivácie injekčnú liekovku rýchlo rozmrazte ponorením do vodného kúpeľa s teplotou 37 °C s čistou vodou a antimikrobiálnym prostriedkom, pričom ju jemne miešajte 40 - 60 sekúnd, kým nezostane malý ľadový chumáč.
4. Všetky ďalšie kroky vykonajte v sterilných podmienkach v prietokovom digestore a pred otvorením kryovialku dezinfikujte 70 % etanolom.
5. Opatrne otvorte dezinfikovanú fľaštičku a preneste bunkovú suspenziu do 15 ml centrifugačnej skúmavky obsahujúcej 8 ml kultivačného média s izbovou teplotou a jemne premiešajte.
6. Zmes odstredujte pri 300 x g počas 3 minút, aby sa bunky oddelili, a opatrne zlikvidujte supernatant obsahujúci zvyšky zmrazovacieho média.
7. Pelet buniek jemne resuspendujte v 10 ml čerstvého kultivačného média. V prípade adherentných buniek rozdeľte suspenziu medzi dve kultivačné banky T25; v prípade suspenzných kultúr preneste všetko médium do jednej banky T25, aby ste podporili účinnú interakciu a rast buniek.
8. Dodržiavajte zavedené subkultivačné protokoly na nepretržitý rast a udržiavanie bunkovej línie, čím sa zabezpečia spoľahlivé výsledky experimentov.

Incubation Atmosphere 37 °C, 5 % CO_2 , zvlhčená atmosféra.

Flask Coating Žiadne

bunky 3T3-L1 | 400107

Freezing Procedure

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

Shipping Conditions

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

Storage Conditions

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Kontrola kvality / Genetický profil / HLA

Sterility

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplazmiem založených na luminiscencii.

Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.