

Celice SK-N-DZ | 305628

Splošne informacije

Description

Celična linija SK-N-DZ je model človeškega neuroblastoma, vzpostavljen iz metastatske kostnega mozga otroka z neuroblastomom. Je del serije celičnih linij neuroblastoma SK-N in kaže značilnosti tumorskih celic, ki izvirajo iz nevralnega grebena. Te celice se v kulturi adhirirajo in kažejo majhen delež celic stranske populacije (SP), kar kaže na subpopulacijo, podobno rakovnim matičnim celicam, z visoko sposobnostjo izločanja zdravil.

Celice SK-N-DZ se obsežno uporabljajo v raziskavah za razumevanje vloge genetskih in epigenetskih sprememb pri neuroblastomu. Pokazalo se je, da ta celična linija vsebuje amplifikacijo gena MYCN in mutacije gena ALK, ki sta povezani z agresivnim fenotipom in slabo prognozo neuroblastomov z visokim tveganjem. Poleg tega se SK-N-DZ uporablja za ocenjevanje terapevtskih odzivov na zdravila, kot so retinoidi in derivati vitamina E. Študije so pokazale, da je SK-N-DZ edinstveno občutljiva na 13-cis-retinoinsko kislino, pri čemer v nasprotju z drugimi celičnimi linijami neuroblastoma že pri nizkih koncentracijah kaže znatno celično lizo.

Linija SK-N-DZ se je uporabljala v poskusih, ki so raziskovali diferenciacijo in izvirne lastnosti neuroblastoma. Sposobnost te celične linije, da pod določenimi pogoji zdravljenja tvori nevrtno izrastke, poudarja njen potencial za raziskovanje diferenciacije tumorja in celične plastičnosti. Te lastnosti, skupaj z njenim dobro opredeljenim genetskim ozadjem, delajo SK-N-DZ dragocen model za napredek terapevtskih strategij in razumevanje molekularnih temeljev neuroblastoma.

Organism

Človek

Tissue

Možgani

Disease

Neuroblastom

Metastatic site

Kostni mozeg

Applications

Raziskave tumorjev. Raziskave odpornosti na MRD-1. Izjemna občutljivost na cis-retinoinsko kislino; 3D-celična kultura, imunologija, nevroznanost

Synonyms

SKNDZ

Značilnosti

Age

2 leti

Gender

Ženske

Ethnicity

Kavkazci in severnoameriški staroselci

Morphology

Epitelijski

Celice SK-N-DZ | 305628

Cell type	Nevronski
-----------	-----------

Growth properties	Pripadajoče
-------------------	-------------

Regulativni podatki

Citation	SK-N-DZ (katalogska številka Cytion 305628)
----------	---

Biosafety level	1
-----------------	---

NCBI_TaxID	9606
------------	------

CellosaurusAccession	CVCL_1701
----------------------	-----------

Biomolekularni podatki

Mutational profile	Mutacija: TP53, preprosta, p.Arg110Leu (c.329G>T), homozigotna
--------------------	--

Ravnanje s spletno stranjo

Culture Medium	DMEM, w: 4,5 g/L glukoze, w: 4 mM L-glutamina, w: 3,7 g/L NaHCO ₃ , w: 1,0 mM natrijevega piruvata (številka izdelka Cytion 820300a)
----------------	---

Supplements	Gojišče dopolnite z 10 % FBS
-------------	------------------------------

Dissociation Reagent	Accutase
----------------------	----------

Seeding density	0,3 × 10 ⁶ celic/ml
-----------------	--------------------------------

Fluid renewal	2 do 3-krat na teden
---------------	----------------------

Freeze medium	Kot gojišče za kriokonzervacijo uporabljamo popolno rastno gojišče (vključno s FBS) + 10 % DMSO za ustrezno vitalnost po odmrznitvi ali CM-1 (katalogska številka 800100 podjetja Cytion), ki vključuje optimizirane osmoprotektante in presnovne stabilizatorje za izboljšanje okrevanja in zmanjšanje stresa, povzročenega s kriom.
---------------	---

Celice SK-N-DZ | 305628

Thawing and Culturing Cells

1. Prepričajte se, da je viala ob dostavi globoko zamrznjena, saj se celice pošiljajo na suhem ledu, da se med prevozom ohranijo optimalne temperature.
2. Po prejemu kriovial takoj shranite pri temperaturi pod -150°C , da zagotovite ohranitev celične celovitosti, ali pa nadaljujte s korakom 3, če je potrebno takojšnje gojenje.
3. Za takojšnje gojenje vialo hitro odtalite tako, da jo potopite v vodno kopel s čisto vodo in protimikrobnim sredstvom pri 37°C ter 40-60 sekund nežno mešate, dokler ne ostane majhen ledeni kepica.
4. Vse nadaljnje korake izvajajte v sterilnih pogojih v pretočni nape, pred odprtjem pa kriovial razkužite s 70 % etanolom.
5. Previdno odprite razkuženo vialo in celično suspenzijo prenesite v 15-mililitrsko centrifugirno epruveto, ki vsebuje 8 ml gojišča sobne temperature, ter nežno premešajte.
6. Mešanico centrifugirajte pri $300 \times g$ 3 minute, da ločite celice, in previdno zavržite supernatant, ki vsebuje ostanke zamrzovalnega gojišča.
7. Pelet celic nežno ponovno suspendirajte v 10 ml svežega gojišča. Pri adherentnih celicah suspenzijo razdelite med dve bučki T25; pri suspenzijskih kulturah prenesite vse gojišče v eno bučko T25, da spodbudite učinkovito interakcijo in rast celic.
8. Upoštevajte uveljavljene protokole subkultur za nadaljnjo rast in vzdrževanje celične linije ter tako zagotovite zanesljive rezultate poskusov.

Incubation Atmosphere

37°C , 5 % CO_2 , vlažno ozračje.

Shipping Conditions

Kriokonzervirane celične linije se pošiljajo na suhem ledu v potrjeni, izolirani embalaži z zadostno količino hladilnega sredstva, da se med prevozom vzdržuje približno -78°C . Ob prejemu takoj preglejte embalažo in vialo nemudoma prenesite v ustrezno skladišče.

Storage Conditions

Za dolgotrajno shranjevanje vial postavite v tekoči dušik v parni fazi pri približno -150 do -196°C . Shranjevanje pri -80°C je sprejemljivo le kot kratek vmesni korak pred prenosom v tekoči dušik.

Kontrola kakovosti in molekularna analiza

Celice SK-N-DZ | 305628

Sterility

Kontaminacija z mikoplazmo se izključi z uporabo testov na podlagi PCR in metod za odkrivanje mikoplazme na podlagi luminiscence.

Da se zagotovi, da ni kontaminacije z bakterijami, glivami ali kvasovkami, se celične kulture dnevno vizualno pregledujejo.