# ETK-1 | 305529

## [redacted]

| | |
|---|---|
| **Description** | ETK-1 [redacted] (IHCCA) [redacted]<br><br>[redacted] ETK-1 [redacted] γ- [redacted] mesenchymal transition)<br><br>ETK-1 [redacted] phenotype) [redacted] ETK-1 [redacted] |
| **Organism** | [redacted] |
| **Tissue** | [redacted] |
| **Disease** | [redacted] |
| **Metastatic site** | [redacted] |
| **Synonyms** | ETK1 |

## [redacted]

| | |
|---|---|
| **Age** | 61 [redacted] |
| **Gender** | [redacted] |
| **Ethnicity** | [redacted] |
| **Growth properties** | [redacted] |

## [redacted]

| | |
|---|---|
| **Citation** | ETK-1 ([redacted] Cytion 305529) |
| **Biosafety level** | 1 |
| **NCBI_TaxID** | 9606 |
| **CellosaurusAccession** | CVCL_1206 |

## [redacted] ETK-1 | 305529

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Mutational profile** | [redacted]: p.Arg175His, [redacted] |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Culture Medium** | RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 [redacted]/[redacted] NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a) |
| **Supplements** | [redacted] FBS 10% |
| **Dissociation Reagent** | Accutase, 5 [redacted], 37°C |
| **Subculturing** | [redacted] PBS [redacted] T25 [redacted] |
| **Seeding density** | 1 [redacted] 3 x $10^4$ [redacted]/[redacted]$^2$ |
| **Fluid renewal** | 2 [redacted] 3 [redacted] |
| **Post-Thaw Recovery** | [redacted] 24 [redacted] |
| **Freeze medium** | [redacted] + 10% DMSO [redacted] |

## [redacted] ETK-1 | 305529

| | |
|---|---|
| **Thawing and Culturing Cells** | 1. [redacted]<br>2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted]<br>3. [redacted] 37 [redacted]<br>4. [redacted] 70%<br>5. [redacted] 15 [redacted]<br>6. [redacted] 200 x g [redacted] 5 [redacted]<br>7. [redacted] |
| **Incubation Atmosphere** | 37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted] |
| **Shipping Conditions** | [redacted] |
| **Storage Conditions** | [redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted] |

## [redacted] / [redacted] / HLA