

## A20 Hücreleri | 305263

## Genel bilgi

## Description

A20 hücre hattı bir faredeki retikulum hücre sarkomundan türetilmiştir ve immünoloji ve kanser arařtırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Retikulum hücre sarkomu bir tür B-hücre lenfomasıdır ve A20 hücreleri B-hücre lenfomalarının biyolojisini ve bağıřıklık tepkisini incelemek için deęerli bir model saęlar. Bu hücreler özellikle B hücresi gelişimi, aktivasyonu, sinyalizasyonu ve tümör hücreleri ile bağıřıklık sistemi arasındaki etkileşim mekanizmalarını arařtırmak için kullanışlıdır. Ayrıca A20 hücreleri, bağıřıklık düzenlemesi için gerekli olan sitokinlerin üretimi ve işlevine odaklanan arařtırmalarda çok önemli bir rol oynamaktadır.

A20 hücreleri lenfoblastik bir morfoloji sergiler ve yüzey immünoglobulin ve majör histo-uyumluluk kompleksi (MHC) molekülleri de dahil olmak üzere B hücrelerine özgü yüzey işaretlerini ifade eder. Arařtırmacılar antijen sunumu, B-hücresi reseptör sinyali ve çeşitli sitokinlerin bağıřıklık tepkilerindeki rolünü incelemek için A20 hücrelerini kullanmaktadır. Bu hücreler aynı zamanda B-hücreli lenfomaları ve dięer hematolojik maligniteleri tedavi etmeyi amaçlayan monoklonal antikorlar ve kontrol noktası inhibitörleri gibi immünoterapilerin geliştirilmesinde ve test edilmesinde de etkili olmaktadır. Ayrıca A20 hücreleri, klinik öncesi çalışmalarda yeni terapötik ajanların etkinliğini ve güvenliğini deęerlendirmek için bir model görevi görmektedir. A20 hücrelerinin immünolojik arařtırmalarda ve B-hücresi patofizyolojisinin anlaşılmasındaki faydası, kanser arařtırmalarının ilerletilmesi ve yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesindeki önemini vurgulamaktadır.

**Organism** Fare

**Disease** Fare retikulum hücre sarkomu

**Synonyms** A-20

## Özellikler

**Breed/Subspecies** BALB/cAnN

**Age** >15 ay

**Gender** Belirtilmemiş

**Morphology** Lenfoblast

**Cell type** B lenfosit

**Growth properties** Süspansiyon

## Düzenleyici Veriler

**A20 Hücreleri | 305263****Citation** A20 (Cytion katalog numarası 305263)**Biosafety level** 1**NCBI\_TaxID** 10090**CellosaurusAccession** CVCL\_1940**Biyomoleküler Veriler****Tumorigenic** Evet**Elleçleme****Culture Medium** RPMI 1640, w: 2.0 mM stabil Glutamin, w: 2.0 g/L NaHCO<sub>3</sub> (Cytion makale numarası 820700a)**Supplements** Ortamı %10 ısıyla inaktive edilmiş FBS ile destekleyin, 2,5 g/L glukoz ve 10 mM HEPES ekleyin**Subculturing** Süspansiyon hücreleri: Taze besiyeri ile pipetleyerek hücreleri substrattan çıkarın. Tek hücreler elde etmek için süspansiyonu 22 gauge iğneden birkaç kez geçirin ve yeni şişelere dağıtın.**Freeze medium** Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

## A20 Hücreleri | 305263

**Thawing and  
Culturing Cells**

1. Hücreler taşıma sırasında optimum sıcaklıkları korumak için kuru buz üzerinde gönderildiğinden, flakonun teslimat sırasında derin dondurulmuş halde kaldığını teyit edin.
2. Teslim aldıktan sonra, hücresel bütünlüğün korunmasını sağlamak için kriyovialı hemen -150°C'nin altındaki sıcaklıklarda saklayın veya hemen kültürleme gerekiyorsa 3. adıma geçin.
3. Derhal kültürleme için flakonun temiz su ve antimikrobiyal bir madde içeren 37°C'lik bir su banyosuna daldırıp küçük bir buz kümesi kalana kadar 40-60 saniye boyunca hafifçe çalkalayarak hızlıca çözün.
4. Sonraki tüm adımları steril koşullar altında bir akış başlığı içinde gerçekleştirin ve açmadan önce kriyoviyalleri %70 etanol ile dezenfekte edin.
5. Dezenfekte edilmiş flakonun dikkatlice açın ve hücre süspansiyonunu 8 ml oda sıcaklığında kültür ortamı içeren 15 ml'lik bir santrifüj tüpüne aktarın ve hafifçe karıştırın.
6. Hücreleri ayırmak için karışımı 300 x g'de 3 dakika santrifüjleyin ve artık dondurma ortamı içeren süpernatantı dikkatlice atın.
7. Hücre pelletini 10 ml taze kültür ortamında yavaşça yeniden süspansiyon edin. Yapışık hücreler için, süspansiyonu iki T25 kültür şişesi arasında bölün; süspansiyon kültürleri için, etkili hücre etkileşimini ve büyümesini teşvik etmek üzere tüm ortamı tek bir T25 şişesine aktarın.
8. Hücre hattının sürekli büyümesi ve bakımı için belirlenmiş alt kültür protokollerine uyun ve güvenilir deneysel sonuçlar elde edin.

**Incubation  
Atmosphere**

37°C, %5<sub>CO2</sub>, nemlendirilmiş atmosfer.

**Flask Coating**

Yok

**Freezing  
Procedure**

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

**Shipping  
Conditions**

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

## A20 Hücreleri | 305263

### Storage Conditions

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

## Kalite kontrol / Genetik profil / HLA

### Sterility

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır.

Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.