

## MDA-MB-453 Hücreleri | 305042

## Genel bilgi

## Description

MDA-MB-453 hücre hattı, yetişkin bir kadın hastanın plevral efüzyonunun metastatik bölgesinden elde edilen, yaygın olarak incelenen bir insan meme kanseri hücre hattıdır. Bu hücre hattı, androjen reseptörü (AR) pozitifliği ve östrojen reseptörü (ER) ve progesteron reseptörü (PR) ekspresyonunun olmaması gibi benzersiz özellikleri nedeniyle meme kanseri araştırmalarında kullanışlılığıyla bilinir. Bu özellikler, MDA-MB-453'ü üçlü negatif meme kanseri (TNBC) ve androjen reseptörlerinin meme kanseri ilerlemesi ve tedavi direncindeki rolünü incelemek için çok değerli bir model haline getirir.

MDA-MB-453 hücreleri epitelyal morfoloji gösterir ve kültür yüzeylerine yapışarak poligonal hücre şekilleri oluşturur. Hücre hattı ayrıca, ilaç testi ve moleküler yolakların araştırılması gibi prelinik çalışmalar için gerekli olan yüksek proliferatif kapasitesi ve in vitro ve in vivo büyüme kabiliyeti ile karakterizedir. MDA-MB-453 hücrelerinin genetik analizi, kanser hücresinin hayatta kalması ve büyümesinde sıklıkla rol oynayan PIK3CA geni dahil olmak üzere, önemli onkogenler ve tümör baskılayıcılarda mutasyonlar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu hücreler, TNBC hastaları için daha etkili tedaviler geliştirmek amacıyla, özellikle PI3K/AKT/mTOR sinyal yolunu ve AR inhibitörlerini hedefleyen hedefli tedavilerin araştırılmasında da kullanılmaktadır.

**Organism** İnsan

**Tissue** Meme bezi, meme

**Disease** Adenokarsinom

**Metastatic site** Perikardiyal efüzyon

**Synonyms** MDA-MB 453, MDA MB 453, MDA-MB453, MDAMB453, MDA-453, MDA453, MD Anderson-Metastatik Meme-453

## Özellikler

**Age** 48 yıl

**Gender** Kadın

**Ethnicity** Avrupa

**Morphology** Epitelyal

**Growth properties** Yapışık

## Düzenleyici Veriler

## MDA-MB-453 Hücreleri | 305042

**Citation** MDA-MB-453 (Cytion katalog numarası 305042)**Biosafety level** 1**NCBI\_TaxID** 9606**CellosaurusAccession** CVCL\_0418

## Biyomoleküler Veriler

**Receptors expressed** Fibroblast büyüme faktörü (FGF), ifade edilen**Tumorigenic** Hayır

## Elleçleme

**Culture Medium** DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 g/L Glukoz, w: 2.5 mM L-Glutamin, w: 15 mM HEPES, w: 0.5 mM Sodyum piruvat, w: 1.2 g/L NaHCO<sub>3</sub> (Cytion makale numarası 820400a)**Supplements** Ortamı %10 FBS ile takviye edin**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Yapışık hücrelerden eski ortamı çıkarın ve kalsiyum ve magnezyum içermeyen PBS ile yıkayın. T25 şişeleri için 3-5 ml PBS ve T75 şişeleri için 5-10 ml kullanın. Ardından, T25 flasklar için 1-2 ml ve T75 flasklar için 2,5 ml kullanarak hücreleri Accutase ile tamamen kaplayın. Hücreleri ayırmak için oda sıcaklığında 8-10 dakika inkübasyona bırakın. İnkübasyondan sonra, hücreleri yeniden süspansiyon etmek için 10 ml besiyeriyle hafifçe karıştırın, ardından 300xg'de 3 dakika santrifüjleyin. Süpernatantı atın, hücreleri taze besiyerinde yeniden süspansiyon edin ve zaten taze besiyeri içeren yeni şişelere aktarın.**Fluid renewal** haftada 2 ila 3 kez**Freeze medium** Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

**MDA-MB-453 Hücreleri | 305042****Thawing and  
Culturing Cells**

1. Hücreler taşıma sırasında optimum sıcaklıkları korumak için kuru buz üzerinde gönderildiğinden, flakonun teslimat sırasında derin dondurulmuş halde kaldığını teyit edin.
2. Teslim aldıktan sonra, hücresel bütünlüğün korunmasını sağlamak için kriyovialı hemen -150°C'nin altındaki sıcaklıklarda saklayın veya hemen kültürleme gerekiyorsa 3. adıma geçin.
3. Derhal kültürleme için flakonun temiz su ve antimikrobiyal bir madde içeren 37°C'lik bir su banyosuna daldırıp küçük bir buz kümesi kalana kadar 40-60 saniye boyunca hafifçe çalkalayarak hızlıca çözün.
4. Sonraki tüm adımları steril koşullar altında bir akış başlığı içinde gerçekleştirin ve açmadan önce kriyoviyalleri %70 etanol ile dezenfekte edin.
5. Dezenfekte edilmiş flakonun dikkatlice açın ve hücre süspansiyonunu 8 ml oda sıcaklığında kültür ortamı içeren 15 ml'lik bir santrifüj tüpüne aktarın ve hafifçe karıştırın.
6. Hücreleri ayırmak için karışımı 300 x g'de 3 dakika santrifüjleyin ve artık dondurma ortamı içeren süpernatantı dikkatlice atın.
7. Hücre pelletini 10 ml taze kültür ortamında yavaşça yeniden süspansiyon edin. Yapışık hücreler için, süspansiyonu iki T25 kültür şişesi arasında bölün; süspansiyon kültürleri için, etkili hücre etkileşimini ve büyümesini teşvik etmek üzere tüm ortamı tek bir T25 şişesine aktarın.
8. Hücre hattının sürekli büyümesi ve bakımı için belirlenmiş alt kültür protokollerine uyun ve güvenilir deneysel sonuçlar elde edin.

**Incubation  
Atmosphere**

37°C, %5<sub>CO2</sub>, nemlendirilmiş atmosfer.

**Flask Coating**

Yok

**Shipping  
Conditions**

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

**Storage  
Conditions**

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

**Kalite kontrol / Genetik profil / HLA**

**MDA-MB-453 Hücreleri | 305042**

**Sterility**

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır.

Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.