

Клітини IGROV-1 | 305556

Загальна інформація

Description

Клітинна лінія IGROV-1 - це клітинна лінія аденокарциноми яєчників людини, яка широко використовується в дослідженнях, особливо в дослідженнях, пов'язаних з раком яєчників. Клітини IGROV-1, отримані з карциноми яєчників, відомі своєю корисністю для моделювання епітеліального раку яєчників (ЕРЯ), на який припадає більшість злоякісних пухлин яєчників. Ця клітинна лінія використовується в різних контекстах, в тому числі для оцінки реакції на ліки та механізмів, що лежать в основі резистентності до лікарських препаратів. Наприклад, IGROV-1 відіграла важливу роль у тестуванні ефективності таргетної терапії, такої як альфа-таргетний кон'югат антитіло-лікарський препарат мірветуксимаб соравтанзин (IMGN853), що націлений на фолатний рецептор. Цей АЦП показав багатообіцяючі результати, синергізуючи з хіміотерапевтичними препаратами, такими як карбоплатин і доксорубіцин, підвищуючи протипухлинну ефективність через пошкодження ДНК і зупинку клітинного циклу в доклінічних моделях.

На додаток до своєї ролі в дослідженнях раку, IGROV-1 був охарактеризований як модель для вивчення вірусних інфекцій. Нещодавня робота підкреслила його чутливість до SARS-CoV-2, використовуючи експресію АПФ2 для підтримки вірусної реплікації. Було показано, що IGROV-1 розвиває потужну вроджену імунну відповідь на інфекцію, подібну до первинних епітеліальних клітин носа людини, що вказує на її потенціал для серологічних аналізів, тестування протівірусних препаратів та ізоляції вірусних варіантів із зразків пацієнтів. Ця клітинна лінія вважається вигідною для досліджень завдяки ефективній реплікації вірусів порівняно з традиційними моделями, такими як клітини Vero, які можуть призводити до адаптивних мутацій.

Загалом, клітини IGROV-1 слугують цінною моделлю як в онкології, так і у вірусології, підтримуючи дослідження біології пухлин, резистентності до ліків та вірусного патогенезу. Їх актуальність в експериментах з синергії ліків та сумісності з протівірусними дослідженнями підкреслюють їх універсальність та важливість у цій галузі.

Organism Людина

Tissue Яєчник

Disease Ендометріоїдна карцинома

Synonyms Igrov-1, IGROV 1, IGR-OV1, IGROV1, Igrov1, IGR.OV1, IGROV, OV1/P, OV1/p, OV1-P

Характеристики

Age 47 років

Gender Жінка

Ethnicity Кавказець

Клітини IGROV-1 | 305556

Morphology Епітеліальноподібні

Growth properties Адгезійний, одношаровий

Нормативні дані

Citation IGROV-1 (номер за каталогом Cytion 305556)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_1304

Біомолекулярні дані

Tumorigenic Так, на голих мишах.

Mutational profile Мутація: BRCA1, p.Lys654Serfs*47 (с.1961delA), гетерозиготний; Мутація: BRCA2, p.Lys1108Argfs*11 (с.3323delA) (p.Gln1107fs) (с.3320delA); Мутація: PIK3CA, p.Arg38Cys (с.112C>T), гетерозиготний; Мутація: PIK3CA, p.Ter1069TrpinsLysAspAsn (с.3207A>G), гетерозиготний; Мутація: PTEN, p.Thr319fs*1 (с.955_958delACTT) (p.VL317fs) (V317fs*3), гетерозиготний; Мутація: RB1, p.Val654Cysfs*4 (с.1959delA), гетерозиготний; Мутація: SMAD4, p.Gly231Alafs*10 (с.692delG), гетерозиготний; Мутація: SMAD4, p.Leu495Pro (с.1484T>C), гетерозиготний; Мутація: TP53, p.Ser90Leufs*59 (с.267dupC) (с.267_268insC), гетерозиготний; Мутація: TP53, p.Tyr126Cys (с.377A>G), гетерозиготна

Обробка

Culture Medium ДМЕМ, w: 4,5 г/л Глюкоза, w: 4 мм L-глутамін, w: 3,7 г/л NaHCO₃, w: 1,0 мм піруват натрію (цит. номер 820300a)

Supplements Додайте до середовища 10% FBS

Dissociation Reagent Аккутаза

Клітини IGROV-1 | 305556

Subculturing

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини TgrLE Express, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Freeze medium

Як середовище криоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Thawing and Culturing Cells

1. Переконайтеся, що віал залишається глибоко замороженим після доставки, оскільки клітини транспортуються на сухому льоду для підтримання оптимальної температури під час транспортування.
2. Після отримання негайно зберігайте кріовіал при температурі нижче -150°C , щоб забезпечити збереження клітинної цілісності, або перейдіть до кроку 3, якщо потрібне негайне культивування.
3. Для негайного культивування швидко розморозьте віал, зануривши його у водяну баню з чистою водою і антимікробним засобом при температурі 37°C , обережно перемішуючи протягом 40-60 секунд, поки не залишиться невелика крижана грудка.
4. Всі наступні кроки виконуйте в стерильних умовах у проточній витяжній шафі, дезінфікуючи кріовіал 70% етанолом перед відкриттям.
5. Обережно відкрийте продезінфікований флакон і перенесіть клітинну суспензію в 15 мл центрифужну пробірку, що містить 8 мл культурального середовища кімнатної температури, обережно перемішуючи.
6. Відцентрифугуйте суміш при 300 x g протягом 3 хвилин, щоб відокремити клітини, і обережно викиньте надосадову рідину, що містить залишки заморожувального середовища.
7. Обережно ресуспендуйте осад клітин у 10 мл свіжого культурального середовища. Для адгезивних клітин розділіть суспензію між двома культуральними колбами T25; для суспензійних культур перенесіть все середовище в одну колбу T25, щоб сприяти ефективній взаємодії та росту клітин.
8. Дотримуйтесь встановлених протоколів субкультивування для продовження росту і підтримання клітинної лінії, забезпечуючи надійні результати експерименту.

Клітини IGROV-1 | 305556

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO₂, волога атмосфера.

Flask Coating

Для оптимального прикріплення та життєздатності після розморожування ми рекомендуємо використовувати **колби або пластини з колагеновим покриттям**.

Freezing Procedure

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевірній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і негайно перемістіть віали у відповідне місце для зберігання.

Shipping Conditions

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевірній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і негайно перемістіть віали у відповідне місце для зберігання.

Storage Conditions

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Контроль якості / Генетичний профіль / HLA

Sterility

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми.

Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.