

Клітини JIMT-1 | 305433

Загальна інформація

Description

Клітинна лінія JIMT-1 отримана з HER2-позитивної карциноми молочної залози людини і відома своєю резистентністю до трастузумабу, широко використовуваного HER2-таргетної терапії. Це робить JIMT-1 цінною моделлю для вивчення механізмів резистентності до анти-HER2-терапії та розробки нових терапевтичних стратегій. На відміну від багатьох інших HER2-позитивних клітинних ліній раку молочної залози, JIMT-1 імітує клінічні випадки, коли спостерігається початкова відповідь на HER2-таргетну терапію, але згодом розвивається резистентність. Ця особливість зробила її корисною для вивчення ефективності нових препаратів і комбінованих методів лікування, спрямованих на подолання резистентності до трастузумабу.

Клітини JIMT-1 також використовуються в дослідженнях, що вивчають взаємодію між HER2 та іншими сигнальними шляхами, наприклад, за участю рецептора епідермального фактора росту (EGFR). Перехресна взаємодія між цими шляхами сприяє підвищенню стійкості клітин до традиційних методів лікування. Дослідження показали, що клітини JIMT-1 по-різному реагують на різні інгібітори тирозинкінази (TKI) та антитіло-лікарські кон'югати (ADC). Наприклад, хоча клітинна лінія демонструє резистентність до трастузумабу-емтанзину (T-DM1) і лише часткову чутливість до нових препаратів, таких як трастузумаб-дерукстекал (T-DXd), було продемонстровано, що альтернативні АЛК, такі як дизитамаб-ведотин (DV), можуть запропонувати підвищену ефективність.

Дослідження *in vitro* підкреслюють універсальність JIMT-1 для скринінгу препаратів, які впливають не лише на HER2, але й на інші молекулярні шляхи. Ці дослідження надають важливі дані для оцінки синергічних ефектів комбінованих методів лікування, що включають ADC і TKI або нові таргетні методи лікування. Поведінка клітинної лінії в різних сценаріях медикаментозної резистентності підкреслює її важливість у доклінічній розробці ліків, особливо для HER2-позитивного раку молочної залози з набутою або вродженою резистентністю.

Organism Людина

Tissue Груди

Disease Протокова карцинома молочної залози

Metastatic site Плевральний випіт

Synonyms JIMT1, JIMT

Характеристики

Age 62 роки

Gender Жінка

Ethnicity Кавказець

Клітини JIMT-1 | 305433

Morphology Епітеліальноподібні

Growth properties Адгезійний, одношаровий

Нормативні дані

Citation JIMT-1 (номер за каталогом Cytion 305433)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_2077

Біомолекулярні дані

Oncogenes HER-2 (нечутливі до препаратів, що інгібують HER-2, наприклад, трастузумабу), ER-, PR-, AR-

Mutational profile Мутація: PIK3CA, p.Cys420Arg (c.1258T>C), гетерозиготний; Мутація: TP53, p.Arg248Trp (c.742C>T), гомозиготна

Обробка

Culture Medium ДМЕМ, w: 4,5 г/л Глюкоза, w: 4 мМ L-глутамін, w: 3,7 г/л NaHCO₃, w: 1,0 мМ піруват натрію (цит. номер 820300a)

Supplements Додайте до середовища 10% термоінактивованого FBS

Dissociation Reagent Аккутаза

Subculturing Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Seeding density 1×10^4 клітин/см²

Клітини JIMT-1 | 305433

Freeze medium

Як середовище криоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або СМ-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Thawing and Culturing Cells

1. Переконайтеся, що віал залишається глибоко замороженим після доставки, оскільки клітини транспортуються на сухому льоду для підтримання оптимальної температури під час транспортування.
2. Після отримання негайно зберігайте кріовіал при температурі нижче -150°C , щоб забезпечити збереження клітинної цілісності, або перейдіть до кроку 3, якщо потрібне негайне культивування.
3. Для негайного культивування швидко розморозьте віал, зануривши його у водяну баню з чистою водою і антимікробним засобом при температурі 37°C , обережно перемішуючи протягом 40-60 секунд, поки не залишиться невелика крижана грудка.
4. Всі наступні кроки виконуйте в стерильних умовах у проточній витяжній шафі, дезінфікуючи кріовіал 70% етанолом перед відкриттям.
5. Обережно відкрийте продезінфікований флакон і перенесіть клітинну суспензію в 15 мл центрифужну пробірку, що містить 8 мл культурального середовища кімнатної температури, обережно перемішуючи.
6. Відцентрифугуйте суміш при $300 \times g$ протягом 3 хвилин, щоб відокремити клітини, і обережно викиньте надосадову рідину, що містить залишки заморожувального середовища.
7. Обережно ресуспендуйте осад клітин у 10 мл свіжого культурального середовища. Для адгезивних клітин розділіть суспензію між двома культуральними колбами T25; для суспензійних культур перенесіть все середовище в одну колбу T25, щоб сприяти ефективній взаємодії та росту клітин.
8. Дотримуйтесь встановлених протоколів субкультивування для продовження росту і підтримання клітинної лінії, забезпечуючи надійні результати експерименту.

Incubation Atmosphere

37°C , 5% CO_2 , волога атмосфера.

Flask Coating

Ні

Клітини JMT-1 | 305433

Freezing Procedure

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевірній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і негайно перемістіть віали у відповідне місце для зберігання.

Shipping Conditions

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевірній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і негайно перемістіть віали у відповідне місце для зберігання.

Storage Conditions

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Контроль якості / Генетичний профіль / HLA

Sterility

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми.

Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.