

Клітини CT26.WT | 305178

Загальна інформація

Description

CT26.WT - це клітинна лінія, клонована з батьківської лінії CT26, яка була отримана з карциноми товстої кишки, індукованої у мишей BALB/c за допомогою канцерогену N-нітрозно-N-метилуретану (NNMU). Цей процес клонування був проведений з метою отримання клітинної лінії з послідовними характеристиками та відтворюваними результатами в експериментальних умовах. В результаті CT26.WT зберігає фенотип недиференційованої карциноми свого попередника, що робить її надійною моделлю для вивчення різних аспектів колоректального раку, включаючи генез пухлини, її прогресію та мікрооточення.

Ця клітинна лінія широко використовується в онкологічних дослідженнях, зокрема у вивченні імунних реакцій на пухлини. Її сумісність з мишами BALB/c, які генетично ідентичні джерелу клітин CT26.WT, дозволяє дослідникам вивчати складні взаємодії між раковими клітинами та імунною системою в контрольованих, але біологічно релевантних умовах. Використання CT26.WT у синтетичних мишачих моделях допомагає у дослідженні імунотерапевтичних стратегій, таких як ефективність нових імуномодуляторів та роль імунних контрольних точок у прогресуванні раку. Це сприяє розробці більш ефективних методів лікування раку, які згодом можуть бути адаптовані для клінічних випробувань на людях.

Organism

Миша

Tissue

Двоєсточие

Disease

Аденокарцинома товстої кишки

Synonyms

CT26WT

Характеристики

Breed/Subspecies

BALB/c

Morphology

Фібробласт

Growth properties

Адепт

Нормативні дані

Citation

CT26.WT (каталожний номер 305178)

Biosafety level

1

NCBI_TaxID

10090

Клітини CT26.WT | 305178

CellosaurusAccession CVCL_7256

Біомолекулярні дані

Antigen expression H-2d**Tumorigenic** Так

Обробка

Culture Medium RPMI 1640, w: 2,0 мМ стабільний глютамін, w: 2,0 г/л NaHCO₃ (номер за каталожним номером 820700a)**Supplements** Додайте до середовища 10% FBS**Dissociation Reagent** Аккутаза**Subculturing** Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.**Fluid renewal** 2-3 рази на тиждень**Freeze medium** Як середовище криоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Клітини CT26.WT | 305178

**Thawing and
Culturing Cells**

1. Переконайтеся, що віал залишається глибоко замороженим після доставки, оскільки клітини транспортуються на сухому льоду для підтримання оптимальної температури під час транспортування.
2. Після отримання негайно зберігайте кріовіал при температурі нижче -150°C , щоб забезпечити збереження клітинної цілісності, або перейдіть до кроку 3, якщо потрібне негайне культивування.
3. Для негайного культивування швидко розморозьте віал, зануливши його у водяну баню з чистою водою і антимікробним засобом при температурі 37°C , обережно перемішуючи протягом 40-60 секунд, поки не залишиться невелика крижана грудка.
4. Всі наступні кроки виконуйте в стерильних умовах у проточній витяжній шафі, дезінфікуючи кріовіал 70% етанолом перед відкриттям.
5. Обережно відкрийте продезінфікований флакон і перенесіть клітинну суспензію в 15 мл центрифужну пробірку, що містить 8 мл культурального середовища кімнатної температури, обережно перемішуючи.
6. Відцентрифугуйте суміш при $300 \times g$ протягом 3 хвилин, щоб відокремити клітини, і обережно викиньте надосадову рідину, що містить залишки заморожувального середовища.
7. Обережно ресуспендуйте осад клітин у 10 мл свіжого культурального середовища. Для адгезивних клітин розділіть суспензію між двома культуральними колбами T25; для суспензійних культур перенесіть все середовище в одну колбу T25, щоб сприяти ефективній взаємодії та росту клітин.
8. Дотримуйтеся встановлених протоколів субкультивування для продовження росту і підтримання клітинної лінії, забезпечуючи надійні результати експерименту.

**Incubation
Atmosphere**

37°C , 5% CO_2 , волога атмосфера.

Flask Coating

Ні

**Freezing
Procedure**

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевірній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78°C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і негайно перемістіть віали у відповідне місце для зберігання.

Клітини CT26.WT | 305178

Shipping Conditions

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевірній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і негайно перемістіть віали у відповідне місце для зберігання.

Storage Conditions

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Контроль якості / Генетичний профіль / HLA

Sterility

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми.

Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.