

Cellules UM-SCC-125 | 305724

Renseignements généraux

Description

UM-SCC-125 est une lignée cellulaire humaine de carcinome de la tête et du cou (HNSCC) issue du panel UM-SCC de l'Université du Michigan; elle se développe sous forme de monocouche adhérente présentant une morphologie de type épithélial. Elle constitue un modèle bien défini pour les études précliniques comparatives sur le HNSCC au sein de la série multilignée UM-SCC.

Elle peut être utilisée pour l'étude de la sensibilité aux médicaments, de la radiothérapie et des voies de signalisation dans le HNSCC, ainsi que pour des études comparatives au sein du panel UM-SCC. Elle convient au criblage pharmacologique et aux expériences sur des xénogreffes.

Organism

Humain

Tissue

Tête et cou, cavité buccale

Disease

Carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC)

Applications

Recherche sur le carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC); sensibilité aux médicaments; réponse à la radiothérapie; études du panel UM-SCC; modèles de xénogreffes

Caractéristiques

Age

Âge non précisé

Gender

Sexe non précisé

Ethnicity

Origine ethnique non précisée

Morphology

De type épithélial

Cell type

Cellules épithéliales

Growth properties

Adepte

Données réglementaires

Citation

UM-SCC-125 (numéro de catalogue Cytion 305724)

Biosafety level

1

Cellules UM-SCC-125 | 305724

NCBI_TaxID	9606
------------	------

Données biomoléculaires

Manipulation

Culture Medium	DMEM, p/v : 4,5 g/L de glucose, p/v : 4 mM de L-glutamine, p/v : 3,7 g/L de NaHCO ₃ , p/v : 1,0 mM de pyruvate de sodium (référence Cytion 820300a)
----------------	--

Supplements	Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture
-------------	--

Dissociation Reagent	Accutase, 10 min, 37 °C
----------------------	-------------------------

Doubling time	environ 24 à 48 heures
---------------	------------------------

Subculturing	Retirer le milieu, laver avec du PBS sans calcium ni magnésium, recouvrir d'Accutase, incuber pendant 8 à 10 minutes à température ambiante, remettre en suspension dans le milieu, centrifuger à 300 × g pendant 3 minutes, jeter le surnageant, réensemencer dans du milieu frais.
--------------	--

Split ratio	1 à 5
-------------	-------

Seeding density	de 1 à 3 × 10 ⁴ cellules/cm ²
-----------------	---

Fluid renewal	Tous les 2 ou 3 jours
---------------	-----------------------

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet additionné de 10 % de DMSO afin d'assurer une viabilité adéquate après décongélation.
---------------	--

Cellules UM-SCC-125 | 305724

Thawing and Culturing Cells

1. Assurez-vous que le flacon reste bien congelé à la livraison, car les cellules sont expédiées sur de la glace sèche afin de maintenir des températures optimales pendant le transport.
2. À la réception, conservez immédiatement le cryofiole à une température inférieure à -150 °C pour garantir la préservation de l'intégrité cellulaire, ou passez à l'étape 3 si une culture immédiate est nécessaire.
3. Pour une culture immédiate, décongelez rapidement le flacon en l'immergeant dans un bain-marie à 37 °C contenant de l'eau propre et un agent antimicrobien, en agitant doucement pendant 40 à 60 secondes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit morceau de glace.
4. Effectuez toutes les étapes suivantes dans des conditions stériles sous une hotte à flux laminaire, en désinfectant le cryotube avec de l'éthanol à 70 % avant de l'ouvrir.
5. Ouvrez avec précaution le flacon désinfecté et transférez la suspension cellulaire dans un tube à centrifuger de 15 ml contenant 8 ml de milieu de culture à température ambiante, en mélangeant délicatement.
6. Centrifuger le mélange à 200 x g pendant 5 minutes, puis jeter avec précaution le surnageant contenant le milieu de congélation.
7. Suivre la procédure décrite dans la section « Récupération après décongélation ».

Incubation Atmosphere

37 °C, 5 % de CO₂, atmosphère humidifiée.

Shipping Conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

Storage Conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ -150 et -196 °C. L'entreposage à -80 °C n'est acceptable qu'à titre d'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Contrôle de la qualité et analyse moléculaire