Product sheet

Cellules NCI-H1703 | 305090

Renseignements généraux

Description	La lignée cellulaire NCI-H1703 est une lignée de cellules cancéreuses pulmonaires humaines dérivée d'un carcinome épidermoïde du poumon de stade I, prélevé lors d'une résection chez un fumeur de 54 ans. Cette lignée présente une morphologie épithéliale épidermoïde caractéristique du carcinome pulmonaire, ce qui reflète son origine dans le tissu tumoral pulmonaire : contenuRéférence. Elle est classée comme modèle de cancer du poumon à cellules non petites (CPNP), offrant aux chercheurs une représentation in vitro du sous-type squameux du cancer du poumon. La lignée NCI-H1703 est largement utilisée dans la recherche sur le cancer du poumon, en particulier pour étudier le sous-type à cellules squameuses du CPNPC : contenuRéférence. Elle constitue un modèle précieux pour l'étude de la biologie tumorale et des principales voies de signalisation cellulaires impliquées dans la progression du cancer du poumon : contenuRéférence. Les chercheurs utilisent également la lignée NCI-H1703 pour évaluer l'efficacité de composés anticancéreux candidats, y compris diverses thérapies ciblées. De plus, cette lignée cellulaire peut servir à établir des modèles de xénogreffes pour les essais précliniques de nouveaux traitements et à examiner les mécanismes de réponse et de résistance aux médicaments dans le cancer du poumon.
Organism	Humain
Tissue	Poumon
Disease	Carcinome épidermoïde du poumon
Synonyms	NCI-H1703, H-1703, NCIH1703

Caractéristiques

Age	54 ans
Gender	Homme
Ethnicity	européen
Morphology	Épithélial
Growth properties	Adepte

Données réglementaires

Citation	NCI-H1703 (numéro de catalogue Cytion 305090)

Cellules NCI-H1703 | 305090

Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1490

Données biomoléculaires

Manipulation

Culture Medium	RPMI 1640, contenant 2,0 mM de glutamine stable et 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (numéro d'article Cytion 820700a)
Supplements	Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	Retirez l'ancien milieu des cellules adhérentes et lavez-les avec du PBS sans calcium ni magnésium. Pour les flacons T25, utilisez 3 à 5 ml de PBS, et pour les flacons T75, utilisez 5 à 10 ml. Ensuite, recouvrez complètement les cellules d'Accutase, en utilisant 1 à 2 ml pour les flacons T25 et 2,5 ml pour les flacons T75. Laissez les cellules incuber à température ambiante pendant 8 à 10 minutes afin de les détacher. Après l'incubation, mélangez délicatement les cellules avec 10 ml de milieu pour les remettre en suspension, puis centrifugez à 300 x g pendant 3 minutes. Éliminez le surnageant, remettez les cellules en suspension dans du milieu frais, puis transférez-les dans de nouveaux flacons contenant déjà du milieu frais.
Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine
Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Cellules NCI-H1703 | 305090

Thawing and Culturing Cells

1. Assurez-vous que le flacon reste bien congelé à la livraison, car les cellules sont expédiées sur de la glace sèche afin de maintenir des températures optimales pendant le transport.

2. À la réception, conservez immédiatement le cryofiole à une température inférieure à -150 °C pour garantir la préservation de l'intégrité cellulaire, ou passez à l'étape 3 si une culture immédiate est nécessaire.

3. Pour une culture immédiate, décongelez rapidement le flacon en l'immergeant dans un bain-marie à 37 °C contenant de l'eau propre et un agent antimicrobien, en agitant doucement pendant 40 à 60 secondes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit morceau de glace.

4. Effectuez toutes les étapes suivantes dans des conditions stériles sous une hotte à flux laminaire, en désinfectant le cryotube avec de l'éthanol à 70 % avant de l'ouvrir.

5. Ouvrez avec précaution le flacon désinfecté et transférez la suspension cellulaire dans un tube à centrifuger de 15 ml contenant 8 ml de milieu de culture à température ambiante, en mélangeant délicatement.

6. Centrifuger le mélange à 300 x g pendant 3 minutes pour séparer les cellules, puis jeter avec précaution le surnageant contenant le milieu de congélation résiduel.

7. Remettre délicatement le culot cellulaire en suspension dans 10 ml de milieu de culture frais. Pour les cellules adhérentes, répartir la suspension dans deux flacons de culture T25; pour les cultures en suspension, transférer la totalité du milieu dans un seul flacon T25 afin de favoriser une interaction et une croissance cellulaires efficaces.

8. Respectez les protocoles de sous-culture établis pour assurer la croissance continue et le maintien de la lignée cellulaire, garantissant ainsi des résultats expérimentaux fiables.

Incubation Atmosphere

37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Shipping Conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

Storage Conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L'entreposage à −80 °C n'est acceptable qu'à titre d'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Contrôle de la qualité et analyse moléculaire

Sterility	La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence. Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes.