Product sheet

[redacted] H4-II-E-C3 | 305336

[redacted]

Description	[redacted] H4-II-E-C3 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] H4-II-E-C3 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 2
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	H4IIEC3, H4-IIE-C3, H4-II-EC3, H-II-E-C3

[redacted]

Breed/Subspecies	AxC
Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	H4-II-E-C3 ([redacted] Cytion 305336)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10116
CellosaurusAccession	CVCL_0285
GMO Status	GMO-S1: [redacted] (H4-II-E-C3) [redacted], [redacted] -GMO, [redacted]

[redacted]-[redacted]

[redacted] H4-II-E-C3 | 305336

Protein expression	[redacted]: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
Tumorigenic	[redacted], [redacted] AxC

[redacted]

Culture Medium	DMEM, w: 4.5 g/L [redacted], w: 4 mM L-[redacted], w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM [redacted] ([redacted] Cytion 820300a)
Supplements	[redacted] 20% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] [redacted]. [redacted] T25, [redacted] 3-5 [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]. [redacted], [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted], [redacted] C
Thawing and Culturing Cells	

1. [redacted]
2. [redacted] -150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted].
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] -10 [redacted] T2
8. [redacted] -[redacted].

[redacted] H4-II-E-C3 | 305336

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]