

Description	Value
本表为SU-DHL-4 设备在出厂前预置的默认配置。 本表为SU-DHL-4 设备在出厂前预置的默认配置。	38.

Tissue □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

Synonyms SUDHL4, Sudhl4, SUDHL-4, Sudhl-4, SuDHL 4, SUD-4, SUD4, SU4, XXXXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX-4, DHL

Age 38 男

Ethnicity ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Growth properties XXXXXX

Citation	SU-DHL-4 (SU-4818 Cytion 305106)
-----------------	----------------------------------

NCBI TaxID 9606

XXXXXXXXXX XIXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Supplements ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 10% FBS

Subculturing 

Fluid renewal 2 ☒ 3 ☒☒☒☒ ☒☒☒☒☒

Thawing and Culturing Cells

1. 取出冻存管，放入 37℃ 水浴中快速解冻，取出后立即放入冰浴中，离心（1000g，5min），弃去上清液，加入 1ml 新鲜培养基，轻轻混匀，接种于 25cm² 培养瓶中。
2. 将培养瓶置于 37℃ 培养箱中，5% CO₂ 条件下培养。待细胞贴壁后，更换新鲜培养基。
3. 待细胞长至 80% 汇合时，进行传代。将培养液离心（1000g，5min），弃去上清液，加入 1ml 新鲜培养基，轻轻混匀，接种于新的 25cm² 培养瓶中。
4. 重复上述步骤，直至细胞长满培养瓶。
5. 当细胞长满培养瓶时，进行传代。将培养液离心（1000g，5min），弃去上清液，加入 1ml 新鲜培养基，轻轻混匀，接种于新的 25cm² 培养瓶中。
6. 重复上述步骤，直至细胞长满培养瓶。
7. 当细胞长满培养瓶时，进行传代。将培养液离心（1000g，5min），弃去上清液，加入 1ml 新鲜培养基，轻轻混匀，接种于新的 25cm² 培养瓶中。
8. 重复上述步骤，直至细胞长满培养瓶。

Cytion GmbH | Nikola-Tesla-Str. 3 | 69124 Heidelberg | Heidelberg
Heidelberg | +49(0)6221 405780 | www.cytion.com | info@cytion.com

SU-DHL-4 | 305106

Flask Coating 100 µm

Freezing Procedure

1. 将细胞悬液加入含有 10% 胎牛血清 (FBS) 的完全培养基中。2. 将细胞悬液在 4°C 下静置 2 小时。3. 将细胞悬液在 -80°C 下冷冻 2 小时。4. 将细胞悬液在 -80°C 下保存。

Shipping Conditions

1. 将细胞悬液在 4°C 下静置 2 小时。2. 将细胞悬液在 -80°C 下冷冻 2 小时。3. 将细胞悬液在 -80°C 下保存。

Storage Conditions

1. 将细胞悬液在 4°C 下静置 2 小时。2. 将细胞悬液在 -80°C 下冷冻 2 小时。3. 将细胞悬液在 -80°C 下保存。

100 µm 100 µm 100 µm 100 µm

Sterility

1. 将细胞悬液在 4°C 下静置 2 小时。2. 将细胞悬液在 -80°C 下冷冻 2 小时。3. 将细胞悬液在 -80°C 下保存。