

Description	鼠 细胞系 C2C12, 鼠 骨骼肌 细胞系 鼠 细胞 系, 细胞系 细胞 系 鼠 细胞 系 C3H, 细胞 系 鼠 C2C12 细胞系 细胞系 cDNA 细胞系 细胞系 细胞系 细胞系 细胞系, 鼠 细胞 系 细胞 系 细胞 系 细胞 系 细胞 系 细胞系 鼠 细胞系 C2C12 细胞系 细胞系 细胞 系 细胞系 细胞系 细胞系 细胞系 细胞系 细胞系 细胞系 细胞系 细胞系 细胞系 细胞 系 细胞 系 细胞系 鼠 C2C12 细胞 细胞 细胞 细胞 in vivo, 鼠 细胞系 细胞系 细胞系, 鼠 细胞系 C2C12 细胞 细胞 细胞 细胞 细胞 细胞 细胞-细胞, 细胞 细胞系 细胞-细胞系 细胞 细胞系 细胞 系
Organism	鼠
Tissue	鼠
Applications	细胞 细胞系
Synonyms	C2c12, C2-C12, C12

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Breed/Subspecies	C3H
Age	XXXXXXXX
Gender	XXXX
Morphology	XXXX XXXXXXXX
Cell type	XXXXXXXX
Growth properties	XXX

Citation	C2C12 (XXXXX XXXXXXX Cytion 400476)
Biosafety level	1

XXXXX C2C12 | 400476

NCBI_TaxID 10090

CellosaurusAccession CVCL_0188

XXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Culture Medium RPMI 1640, w: 2.0 mM XXXXXXXX XXXX, w: 2.0 g/L NaHCO₃ (XXXXX XXXXXXXX XXX Cytion 820700a)

Supplements XXXX XXXXX 10% FBS

Dissociation Reagent XXXXXXX

Doubling time 24 XXXX

Subculturing XXX XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 4-PBS XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX T25, XXXXXXX 4-3-5 4' 4-PBS, XXXXXXX XXXX 3 XXXX. XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX.

Seeding density 1×10^4 "n" XXXXXXX XXXX XXXX XXXX 4 XXXX.

Fluid renewal XXX 3 XXX 5 XXXX

Post-Thaw Recovery XXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 24 XXXX XXXXXXX.

Freeze medium XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX (XXXXX FBS) + 10% DMSO XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX, XXX C

VVVV VVVVVVVVV VVVVV VVVVVVV VVVVVVVVV VVV VVVVVVV VVVVVVVVV VVVVVVV VVVVVVVVV VVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVV