

XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Subculturing	細胞を新鮮な培養液に移植する際には、細胞を消化し、PBS で洗った後、含有 T25、含有 3-5 ml PBS、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する、細胞を新鮮な培養液に移植する。細胞を新鮮な培養液に移植する。
Split ratio	1:2 又は 1:4
Fluid renewal	2 又は 3 日に一度
Freeze medium	細胞を凍結する際には、細胞を新鮮な培養液に移植する (含有 FBS) + 10% DMSO 含有細胞を新鮮な培養液に移植する、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。
Thawing and Culturing Cells	- 細胞を新鮮な培養液に移植する際には、細胞を消化し、PBS で洗った後、含有 T25、含有 3-5 ml PBS、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。 - 細胞を新鮮な培養液に移植する際には、細胞を消化し、PBS で洗った後、含有 T25、含有 3-5 ml PBS、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。 - 細胞を新鮮な培養液に移植する際には、細胞を消化し、PBS で洗った後、含有 T25、含有 3-5 ml PBS、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。 - 細胞を新鮮な培養液に移植する際には、細胞を消化し、PBS で洗った後、含有 T25、含有 3-5 ml PBS、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。 - 細胞を新鮮な培養液に移植する際には、細胞を消化し、PBS で洗った後、含有 T25、含有 3-5 ml PBS、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。 - 細胞を新鮮な培養液に移植する際には、細胞を消化し、PBS で洗った後、含有 T25、含有 3-5 ml PBS、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。 - 細胞を新鮮な培養液に移植する際には、細胞を消化し、PBS で洗った後、含有 T25、含有 3-5 ml PBS、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。 - 細胞を新鮮な培養液に移植する際には、細胞を消化し、PBS で洗った後、含有 T25、含有 3-5 ml PBS、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。
Incubation Atmosphere	37°C, 5% CO ₂ , 湿度 100%
Flask Coating	細胞を新鮮な培養液に移植する
Freezing Procedure	細胞を凍結する際には、細胞を新鮮な培養液に移植する (含有 FBS) + 10% DMSO 含有細胞を新鮮な培養液に移植する、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。
Shipping Conditions	細胞を凍結する際には、細胞を新鮮な培養液に移植する (含有 FBS) + 10% DMSO 含有細胞を新鮮な培養液に移植する、含有 3 ml 細胞を新鮮な培養液に移植する。

PIEC | 305213

Storage Conditions

XXXXXXXX XXXX XXX, XX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XX X-150 XX 196 XXXXX XXXXXXX. XXXXX XXXXXXX

Sterility

[illegible]

በጊዜ ገደብ ውስጥ የሚገኝ የጥያቄው ቁጥር ለመወሰን ይጠቅማል፡፡