

Product sheet

BJAB | 302006

Cell Line: BJAB

Antigen expression	CD10+, CD19+, CD20+, CD21(+), CD22+, CD23-, CD24-, CD32+, CD37+, CD38+, CD39-, CD40+, CD54+, CD72+, CD73-, CD75+, CD77+, CD81, CD82+, CD83+, CD84+, CD86+
--------------------	---

Karyotype	46, XXXXX
-----------	-----------

Media

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM XXXXX, w: 2.0 g/L NaHCO3 (XXXX XXXXX Cytion 820700a)
----------------	---

Supplements	XXXX XXXXX 20% FBS, 10 mM HEPES
-------------	---------------------------------

Subculturing	XXXX 5-6 / 5-6 / XXXXX 5 x 10
--------------	-------------------------------

Seeding density	3 x 10 ⁵ XXXX/XX
-----------------	-----------------------------

Fluid renewal	XX 3-5 XXXX
---------------	-------------

Post-Thaw Recovery	XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX 48 XXXX XXXX
--------------------	--

Freeze medium	XXXX XXXXX XXXXX, XXX XXXXX XXXXX XXXX (XXXX FBS) + 10% DMSO XXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX, XXX
---------------	--

BJAB | 302006

Thawing and
Culturing Cells

1. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
2. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
3. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
4. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
5. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
6. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
7. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
8. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。

Incubation
Atmosphere

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无涂层

Freezing
Procedure

将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。

Shipping
Conditions

将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。

Storage
Conditions

将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。

细胞培养与转染

Sterility

细胞培养与转染过程中，所有操作均应在无菌条件下进行。PCR扩增应在专用区域进行，以避免污染。

BJAB | 302006

HLA	A*: 01:01:83, '02:01:01
	B*: 13:02:01, 35:01:01
	C*: 04:01:01, 06:02:01
	DRB1*: 12:01:01, 13:02:01
	DQA1*: '01:02:01, '05:05:01
	DQB1*: 03:01, 06:04:01
	DPB1*: '04:02:01G
	E: 01:01, 01:03