

Tumorigenic C57BL/6.

Cytion GmbH | Nikola-Tesla-Str. 3 | 69124 Heidelberg | Germany
 +49(0)6221 405780 | www.cytion.com | info@cytion.com

HEPA 1-6 | 400474

**Thawing and
Culturing Cells**

1. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
2. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
3. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
4. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
5. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
6. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
7. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
8. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无涂层

**Freezing
Procedure**

将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。

**Shipping
Conditions**

将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。

**Storage
Conditions**

将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。

HEPA 1-6 | 400474

Sterility

本产品经过严格的灭菌处理，确保无菌。本产品适用于PCR、qPCR、RT-PCR、Western blot、ELISA、流式细胞术、细胞培养、细胞分选、细胞计数、细胞凋亡检测、细胞增殖检测、细胞毒性检测、细胞活力检测、细胞凋亡检测、细胞增殖检测、细胞毒性检测、细胞活力检测。