Product sheet

Células SNU-398 | 305274

Informações gerais

Description	A linhagem celular SNU-398 é derivada de um carcinoma hepatocelular (CHC) de um adulto humano. Essa linhagem celular é amplamente utilizada na pesquisa sobre câncer de fígado para estudar os mecanismos moleculares subjacentes à hepatocarcinogênese, à progressão tumoral e ao desenvolvimento de estratégias terapêuticas. O carcinoma hepatocelular é uma forma prevalente e letal de câncer de fígado, e as células SNU-398 constituem um modelo relevante para a investigação das alterações genéticas e epigenéticas associadas a essa doença. As células SNU-398 apresentam morfologia epitelial e expressam marcadores característicos do câncer de fígado, como a alfa-fetoproteína (AFP) e as citoqueratinas. Elas apresentam mutações e alterações genéticas típicas do HCC, incluindo mutações no gene TP53, que é comumente associado a muitos tipos de câncer. Os pesquisadores utilizam as células SNU-398 para explorar várias vias de sinalização envolvidas no câncer de fígado, como as vias Wnt/β-catenina, PI3K/Akt e MAPK. Essas células também são empregadas em ensaios de triagem de medicamentos para avaliar a eficácia de agentes quimioterápicos e terapias direcionadas, bem como em estudos que investigam mecanismos de resistência a tratamentos convencionais. A importância da linhagem celular SNU-398 na pesquisa do carcinoma hepatocelular reside em sua capacidade de modelar a biologia do câncer de fígado e de contribuir para o desenvolvimento de terapias mais eficazes para pacientes com câncer de fígado.
Organism	Humano
Tissue	Fígado
Disease	Carcinoma hepatocelular em adultos
Synonyms	SNU398, NCI-SNU-398

Características

Age	42 anos
Gender	Masculino
Ethnicity	Coreano
Morphology	Epithelial
Growth properties	Aderente

Dados regulatórios

Células SNU-398 | 305274

Citation	SNU-398 (número de catálogo da Cytion 305274)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0077

Dados biomoleculares

Surface antigens	Tipo sanguíneo 0, Rh+
Viruses	Transformante: vírus da hepatite B (VHB)
Mutational profile	Mutação: CTNNB1, p.Ser37Cys (c.110C>G), heterozigótica; Mutação: TP53, p.Ser215Ile (c.644G>T), heterozigótica

Manuseio

Culture Medium	RPMI 1640, com 2,0 mM de glutamina estável e 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion: 820700a)
Supplements	Adicione ao meio 10% de FBS inativado por calor e 25 mM de HEPES
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio nem magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com Accutase, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco.
Fluid renewal	2 a 3 vezes por semana
Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Células SNU-398 | 305274

Thawing and Culturing Cells

1. Verifique se o frasco permanece profundamente congelado no momento da entrega, pois as células são enviadas em gelo seco para manter as temperaturas ideais durante o transporte.
2. Após o recebimento, armazene o criovial imediatamente a temperaturas abaixo de -150 °C para garantir a preservação da integridade celular ou prossiga para a etapa 3, caso seja necessária a cultura imediata.
3. Para cultura imediata, descongele rapidamente o frasco imergindo-o em um banho-maria a 37 °C com água limpa e um agente antimicrobiano, agitando suavemente por 40 a 60 segundos até que reste apenas um pequeno pedaço de gelo.
4. Realize todas as etapas subsequentes em condições estéreis em uma cabine de fluxo, desinfetando o criovial com etanol a 70% antes de abri-lo.
5. Abra cuidadosamente o frasco desinfetado e transfira a suspensão celular para um tubo de centrífuga de 15 ml contendo 8 ml de meio de cultura à temperatura ambiente, misturando delicadamente.
6. Centrifugue a mistura a 300 x g por 3 minutos para separar as células e descarte cuidadosamente o sobrenadante contendo o meio de congelamento residual.
7. Ressuspender suavemente o sedimento celular em 10 ml de meio de cultura fresco. Para células aderentes, dividir a suspensão entre dois frascos de cultura T25; para culturas em suspensão, transferir todo o meio para um frasco T25 a fim de promover a interação e o crescimento celular eficazes.
8. Siga os protocolos de subcultura estabelecidos para o crescimento contínuo e a manutenção da linhagem celular, garantindo resultados experimentais confiáveis.

Incubation Atmosphere

37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Shipping Conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

Storage Conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Controle de Qualidade e Análise Molecular

Células SNU-398 | 305274

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.

Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.