Product sheet

Células MARC-145 | 305006

Informações gerais

Description	A linhagem celular MARC-145 é uma linhagem de células epiteliais de rim de macaco derivada do macaco verde africano (Cercopithecus aethiops). Essa linha celular é particularmente notável por seu uso na virologia, especialmente na propagação do vírus da síndrome reprodutiva e respiratória suína (PRRSV), um importante patógeno na indústria suinícola. As células MARC-145 têm sido fundamentais no estudo do PRRSV devido à sua alta suscetibilidade ao vírus, tornando-as uma ferramenta valiosa para o isolamento viral, a propagação e o desenvolvimento de vacinas. As células MARC-145 são caracterizadas por sua morfologia epitelial e crescimento robusto in vitro, o que facilita a produção em larga escala do PRRSV para fins de pesquisa. Além disso, elas têm sido utilizadas para explorar os mecanismos da infecção pelo PRRSV, incluindo a entrada do vírus, a replicação e as interações entre o hospedeiro e o patógeno. Essa linhagem celular também tem sido utilizada no desenvolvimento e no teste de compostos antivirais e vacinas contra o PRRSV, contribuindo significativamente para os esforços voltados ao controle dessa doença de grande importância econômica em suínos.
Organism	Chlorocebus pygerythrus (macaco-vervet)
Tissue	Rim embrionário
Synonyms	Marc-145, MARC 145, Marc 145, MARC145, Marc145, Centro de Pesquisa em Animais de Corte-145

Características

Age	Feto
Morphology	Epithelial
Growth properties	Aderente

Dados regulatórios

Citation	MARC-145 (número de catálogo da Cytion 305006)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	60710
CellosaurusAccession	CVCL_4540

Células MARC-145 | 305006

Dados biomoleculares

Manuseio

Culture Medium	DMEM, p/v: 4,5 g/L de glicose, p/v: 4 mM de L-glutamina, p/v: 3,7 g/L de $NaHCO_3$, p/v: 1,0 mM de piruvato de sódio (número de artigo da Cytion 820300a)
Supplements	Adicione 10% de FBS ao meio
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio nem magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com Accutase, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco.
Fluid renewal	2 a 3 vezes por semana
Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Células MARC-145 | 305006

Thawing and Culturing Cells

1. Verifique se o frasco permanece profundamente congelado no momento da entrega, pois as células são enviadas em gelo seco para manter as temperaturas ideais durante o transporte.
2. Após o recebimento, armazene o criovial imediatamente a temperaturas abaixo de -150 °C para garantir a preservação da integridade celular ou prossiga para a etapa 3, caso seja necessária a cultura imediata.
3. Para cultura imediata, descongele rapidamente o frasco imergindo-o em um banho-maria a 37 °C com água limpa e um agente antimicrobiano, agitando suavemente por 40 a 60 segundos até que reste apenas um pequeno pedaço de gelo.
4. Realize todas as etapas subsequentes em condições estéreis em uma cabine de fluxo, desinfetando o criovial com etanol a 70% antes de abri-lo.
5. Abra cuidadosamente o frasco desinfetado e transfira a suspensão celular para um tubo de centrífuga de 15 ml contendo 8 ml de meio de cultura à temperatura ambiente, misturando delicadamente.
6. Centrifugue a mistura a 300 x g por 3 minutos para separar as células e descarte cuidadosamente o sobrenadante contendo o meio de congelamento residual.
7. Ressuspender suavemente o sedimento celular em 10 ml de meio de cultura fresco. Para células aderentes, dividir a suspensão entre dois frascos de cultura T25; para culturas em suspensão, transferir todo o meio para um frasco T25 a fim de promover a interação e o crescimento celular eficazes.
8. Siga os protocolos de subcultura estabelecidos para o crescimento contínuo e a manutenção da linhagem celular, garantindo resultados experimentais confiáveis.

Incubation Atmosphere

37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Shipping Conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

Storage Conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Controle de Qualidade e Análise Molecular

Células MARC-145 | 305006

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.

Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.