Product sheet

Células A875 | 305099

Informações gerais

Description	A linhagem celular A875 é uma linhagem de melanoma humano derivada de um foco metastático em uma mulher de 40 anos. Apresentando características morfológicas e de crescimento típicas do melanoma maligno, a A875 tem sido amplamente utilizada em pesquisas oncológicas, com foco especial na biologia do melanoma, nos mecanismos de metástase e na resistência terapêutica. Essa linha celular é caracterizada por seu crescimento agressivo e potencial metastático, o que a torna um excelente modelo para estudos in vivo sobre crescimento tumoral e metástase em modelos de xenoenxertos. As células A875 são particularmente valiosas para investigar os fundamentos moleculares e genéticos da progressão do melanoma. As pesquisas envolvendo essa linhagem celular incluem estudos sobre os papéis dos oncogenes, dos genes supressores de tumor e de várias vias de sinalização que são fundamentais no desenvolvimento e na progressão do câncer. A linhagem celular tem sido utilizada na avaliação de novos agentes quimioterápicos e terapias direcionadas, beneficiando-se de suas alterações genéticas que imitam as encontradas em melanomas humanos. Além disso, a A875 serve como um modelo fundamental para avaliar os mecanismos de resposta imunológica ao melanoma, devido à sua capacidade de provocar fortes reações imunológicas, auxiliando assim no desenvolvimento e no teste de novas imunoterapias.
Organism	Humano
Tissue	Pele
Disease	Melanoma
Synonyms	A-875

Características

Age	40 anos
Gender	Mulher
Morphology	Poligonal
Growth properties	Aderente

Dados regulatórios

Citation	A875 (número de catálogo da Cytion 305099)
Biosafety level	1

Células A875 | 305099

NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_4733

Dados biomoleculares

Manuseio

Culture Medium	DMEM, p/v: 4,5 g/L de glicose, p/v: 4 mM de L-glutamina, p/v: 3,7 g/L de $NaHCO_3$, p/v: 1,0 mM de piruvato de sódio (número de artigo da Cytion 820300a)
Supplements	Adicione 10% de FBS ao meio
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	Remova o meio antigo das células aderentes e lave-as com PBS sem cálcio nem magnésio. Para frascos T25, use 3 a 5 ml de PBS; para frascos T75, use 5 a 10 ml. Em seguida, cubra as células completamente com Accutase, utilizando 1 a 2 ml para frascos T25 e 2,5 ml para frascos T75. Deixe as células incubarem à temperatura ambiente por 8 a 10 minutos para que se desprendam. Após a incubação, misture delicadamente as células com 10 ml de meio para ressuspender, depois centrifugue a 300xg por 3 minutos. Descarte o sobrenadante, ressuspenda as células em meio fresco e transfira-as para novos frascos que já contenham meio fresco.
Fluid renewal	2 a 3 vezes por semana
Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Células A875 | 305099

Thawing and Culturing Cells

1. Verifique se o frasco permanece profundamente congelado no momento da entrega, pois as células são enviadas em gelo seco para manter as temperaturas ideais durante o transporte.
2. Após o recebimento, armazene o criovial imediatamente a temperaturas abaixo de -150 °C para garantir a preservação da integridade celular ou prossiga para a etapa 3, caso seja necessária a cultura imediata.
3. Para cultura imediata, descongele rapidamente o frasco imergindo-o em um banho-maria a 37 °C com água limpa e um agente antimicrobiano, agitando suavemente por 40 a 60 segundos até que reste apenas um pequeno pedaço de gelo.
4. Realize todas as etapas subsequentes em condições estéreis em uma cabine de fluxo, desinfetando o criovial com etanol a 70% antes de abri-lo.
5. Abra cuidadosamente o frasco desinfetado e transfira a suspensão celular para um tubo de centrífuga de 15 ml contendo 8 ml de meio de cultura à temperatura ambiente, misturando delicadamente.
6. Centrifugue a mistura a 300 x g por 3 minutos para separar as células e descarte cuidadosamente o sobrenadante contendo o meio de congelamento residual.
7. Ressuspender suavemente o sedimento celular em 10 ml de meio de cultura fresco. Para células aderentes, dividir a suspensão entre dois frascos de cultura T25; para culturas em suspensão, transferir todo o meio para um frasco T25 a fim de promover a interação e o crescimento celular eficazes.
8. Siga os protocolos de subcultura estabelecidos para o crescimento contínuo e a manutenção da linhagem celular, garantindo resultados experimentais confiáveis.

Incubation Atmosphere

37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Shipping Conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

Storage Conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Controle de Qualidade e Análise Molecular

Células A875 | 305099

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.

Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.