Product sheet

Panc 05.04 Tế bào | 305394

Thông tin chung

Description	Dòng tế bào Panc 05.04 là một mô hình ung thư biểu mô tuyến ống tụy (PDAC), đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá để nghiên cứu sinh học ung thư tụy và phản ứng điều trị. Có nguồn gốc từ một khối u tuyến tụy ở người, Panc 05.04 là một công cụ quan trọng trong nghiên cứu tiền lâm sàng do liên quan đến một trong những loại ung thư ác tính nhất với tiên lượng xấu cho bệnh nhân. Dòng tế bào này thể hiện các đặc điểm phân tử và gen phù hợp với bản chất không đồng nhất của PDAC, bao gồm các đột biến thường thấy ở KRAS, TP53 và các gen gây ung thư khác, vốn phổ biến trong quá trình tiến triển của ung thư tuyến tụy. Panc 05.04 đã được phân tích chi tiết trong khuôn khổ các dự án di truyền quy mô lớn, chẳng hạn như Bách khoa toàn thư về Dòng tế bào Ung thư (CCLE), nơi biểu hiện gen, biến thể số bản sao và độ nhạy cảm với thuốc của dòng tế bào này đã được xác định. Đáng chú ý, Panc 05.04 đã được đánh giá về phản ứng dược lý đối với các tác nhân chống ung thư khác nhau, cung cấp thông tin về các đặc điểm nhạy cảm hoặc kháng thuốc đối với hóa trị và liệu pháp đích. Với tư cách là một hệ thống mô hình, Panc 05.04 hỗ trợ các nghiên cứu về các cơ chế phân tử cơ bản liên quan đến sự tiến triển của ung thư tuyến tụy (PDAC), kháng hóa trị và tương tác với vi môi trường khối u. Nó cũng cung cấp một nền tảng để thử nghiệm các liệu pháp nhắm mục tiêu và chiến lược miễn dịch trị liệu mới nhằm khắc phục tính kháng trị của ung thư tuyến tụy.
Organism	Con người
Tissue	Tụy
Disease	Ung thư biểu mô tuyến
Applications	văn hóa tế bào 3D
Synonyms	Panc-05.04, Panc_05_04, Panc05.04, Panc 5.04, Panc5.04, PANC0504, Panc0504, Pa18C, PL-18, PL18

Đặc điểm

Age	77 năm
Gender	Nữ
Ethnicity	Người da trắng
Morphology	Tương tự biểu mô
Cell type	Tế bào biểu mô

Panc 05.04 Tế bào | 305394

Growth properties	Người tuân thủ

Dữ liệu quy định

Citation	Panc 05.04 (Mã sản phẩm Cytion 305394)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCl_1637

Dữ liệu sinh học phân tử

Antigen expression	MHC loại I dương tính; MHC loại II âm tính; Nhóm máu B; Rh dương tính
Oncogenes	K-ras dương tính
Tumorigenic	Đúng; Đúng ở chuột nude hoặc chuột SCID
Mutational profile	Đột biến: KRAS, Đơn giản, p.Gly12Asp (c.35G>A), dị hợp tử

Xử lý

Culture Medium	RPMI 1640, chứa: 2,0 mM glutamine ổn định, chứa: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Số hiệu sản phẩm Cytion 820700a)
Supplements	Bổ sung 15% huyết thanh bò phôi (FBS) vào môi trường nuôi cấy
Dissociation Reagent	Trypsin-EDTA
Doubling time	46 giờ

Panc 05.04 Tế bào | 305394

Subculturing	Đối với nuôi cấy tế bào bám dính thông thường: Hút bỏ môi trường nuôi cấy cũ khỏi tế bào bám dính và rửa chúng bằng PBS để loại bỏ bất kỳ môi trường còn lại nào. Sau khi hút hết PBS, thêm lượng thích hợp dung dịch Trypsin/EDTA dựa trên kích thước bình nuôi cấy (ví dụ: 1 ml cho bình T25, 3 ml cho bình T75) và ủ ở nhiệt độ phòng hoặc 37°C cho đến khi tế bào tách ra (5-10 phút). Theo dõi quá trình tách rời dưới kính hiển vi và nhẹ nhàng gõ nhẹ vào bình nếu cần thiết để giải phóng tế bào. Sau khi tách rời, thêm môi trường nuôi cấy hoàn chỉnh để vô hiệu hóa Trypsin/EDTA, nhẹ nhàng trộn đều tế bào và chuyển một phần của hỗn hợp tế bào vào bình nuôi cấy mới chứa môi trường tươi. Đặt bình vào tủ ấm được cài đặt ở 37°C với 5%$_{CO_2}$, và thay môi trường mỗi 2-3 ngày.
Fluid renewal	1 đến 2 lần mỗi tuần
Freeze medium	Như một môi trường bảo quản đông lạnh, chúng tôi sử dụng môi trường tăng trưởng hoàn chỉnh (bao gồm FBS) + 10% DMSO để đảm bảo độ sống sau khi rã đông, hoặc CM-1 (mã sản phẩm Cytion 800100), bao gồm các chất bảo vệ thẩm thấu và chất ổn định chuyển hóa được tối ưu hóa để cải thiện quá trình phục hồi và giảm stress do đông lạnh gây ra.

Thawing and Culturing Cells

1. Xác nhận rằng ống nghiệm vẫn được đông lạnh sâu khi giao hàng, vì tế bào được vận chuyển trên đá khô để duy trì nhiệt độ tối ưu trong quá trình vận chuyển.
2. Khi nhận hàng, hãy bảo quản ống nghiệm đông lạnh ngay lập tức ở nhiệt độ dưới -150°C để đảm bảo tính toàn vẹn của tế bào, hoặc tiến hành bước 3 nếu cần nuôi cấy ngay lập tức.
3. Để nuôi cấy ngay lập tức, hãy rã đông ống nghiệm nhanh chóng bằng cách ngâm nó trong bồn nước 37°C với nước sạch và chất kháng khuẩn, khuấy nhẹ trong 40-60 giây cho đến khi còn lại một khối băng nhỏ.
4. Thực hiện tất cả các bước tiếp theo trong điều kiện vô trùng trong tủ hút khí, khử trùng ống cryovial bằng cồn 70% trước khi mở.
5. Mở ống đã khử trùng một cách cẩn thận và chuyển hỗn hợp tế bào vào ống ly tâm 15 ml chứa 8 ml môi trường nuôi cấy ở nhiệt độ phòng, khuấy nhẹ.
6. Ly tâm hỗn hợp ở 300 x g trong 3 phút để tách tế bào và cẩn thận loại bỏ dịch siêu âm chứa môi trường đông lạnh còn lại.
7. Nhẹ nhàng hòa tan lại khối tế bào trong 10 ml môi trường nuôi cấy tươi. Đối với tế bào bám dính, chia hỗn hợp vào hai bình nuôi cấy T25; đối với tế bào nuôi cấy lơ lửng, chuyển toàn bộ môi trường vào một bình T25 để thúc đẩy tương tác và phát triển tế bào hiệu quả.
8. Tuân thủ các quy trình nuôi cấy con được thiết lập để duy trì sự phát triển và bảo quản dòng tế bào, đảm bảo kết quả thí nghiệm đáng tin cậy.

Panc 05.04 Tế bào | 305394

Incubation Atmosphere	37°C, 5%$_{CO_2}$, môi trường ẩm.
Shipping Conditions	Các dòng tế bào được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh được vận chuyển trên đá khô trong bao bì cách nhiệt đã được kiểm định, kèm theo lượng chất làm lạnh đủ để duy trì nhiệt độ khoảng −78 °C trong suốt quá trình vận chuyển. Khi nhận hàng, hãy kiểm tra ngay lập tức bao bì và chuyển các ống nghiệm sang nơi lưu trữ phù hợp mà không chậm trễ.
Storage Conditions	Để bảo quản lâu dài, hãy đặt ống nghiệm vào nitơ lỏng ở pha hơi ở nhiệt độ khoảng −150 đến −196 °C. Việc bảo quản ở −80 °C chỉ được chấp nhận như một bước trung gian ngắn hạn trước khi chuyển sang nitơ lỏng.

Kiểm soát chất lượng và phân tích phân tử

Sterility	Sự nhiễm khuẩn Mycoplasma được loại trừ bằng cả các phương pháp xét nghiệm dựa trên PCR và các phương pháp phát hiện Mycoplasma dựa trên phát quang. Để đảm bảo không có nhiễm khuẩn vi khuẩn, nấm hoặc men, các mẫu nuôi cấy tế bào được kiểm tra trực quan hàng ngày.